

Tabla S1. Análisis univariante de factores asociados con la gravedad

	Casos graves		Odds Ratio (IC 95%)	p -valor†
	n	%		
Afectación de cejas				
No	2	40,0%	Referencia	
Sí	31	44,3%	1,19 (0,18-7,55)	1,000
Afectación inicial de cejas				
No	19	52,8%	Referencia	
Sí	12	44,4%	0,72 (0,26-1,95)	0,513
Afectación de vello corporal				
No	18	46,2%	Referencia	
Sí	11	36,7%	0,68 (0,25-1,79)	0,429
Pápulas faciales				
No	22	44,9%	Referencia	
Sí	8	40,0%	0,82 (0,28-2,35)	0,710
Tabaquismo				
No fumadores	26	52,0%	Referencia	
Fumadores y exfumadores	7	28,0%	0,36 (0,13-1,00)	0,048
Liquen				
No	28	42,4%	Referencia	
Sí	4	57,1%	1,81 (0,37-8,73)	0,692
Rosacea				
No	25	41,7%	Referencia	
Sí	8	53,3%	1,60 (0,51-4,99)	0,416
Patrón				
Difuso	20	54,1%	Referencia	
Lineal	5	21,7%	0,24 (0,07-0,77)	
Doble línea	1	33,3%	0,43 (0,04-5,11)	0,035

† P-valor de la prueba chi-Cuadrado o f de Fisher para determinar la existencia de diferencias significativas ($p < 0,05$) en la proporción de casos graves

Tabla S2. Análisis comparativo de las características de los pacientes con distintos patrones

	Patrón Difuso (n= 37)		Patrón Lineal (n=23)		Patrón Doble Linea (n= 3)		p -valor†
	n	%	n	%	n	%	
Afectación de cejas							
Sí	36	97,3%	20	87,0%	3	100,0%	0,306
Afectación inicial de cejas							
Sí	14	45,2%	10	47,6%	0	0,0%	0,627
Afectación de vello corporal							
Sí	16	45,7%	9	39,1%	2	66,7%	0,687
Pápulas faciales							
Sí	6	17,7%	10	43,5%	1	50,0%	0,065
Tabaquismo							
Fumadores y exfumadores	12	32,4%	10	43,5%	0	0,0%	0,363
Liquen							
Sí	3	8,3%	1	4,4%	1	33,3%	0,339
Rosacea							
Sí	6	16,2%	7	30,4%	0	0,0%	0,285
Gravedad							
Sí	20	54,1%	5	21,7%	1	33,3%	0,035

† P-valor de la prueba F de Fisher para determinar la existencia de diferencias significativas ($p < 0,05$) en la proporción de pacientes de cada patrón

Tabla S3. Análisis univariante de factores asociados con la necesidad de tratamiento oral

	Casos con tratamiento oral		Odds Ratio (IC 95%)	p -valor†
	n	%		
Afectación de cejas				
No	1	20,0%	Referencia	
Sí	23	32,9%	1,96 (0,21-18,53)	0,484
Pápulas faciales				
No	12	24,5%	Referencia	
Sí	10	50,0%	3,08 (1,03-9,19)	0,039
Liquen				
No	22	33,3%	Referencia	
Sí	2	28,6%	0,80 (0,14-4,46)	1,000
Rosacea				
No	14	23,3%	Referencia	
Sí	10	66,7%	6,57 (1,92-22,46)	0,004
Patrón				
Difuso	11	29,7%	Referencia	
Lineal	7	30,4%	1,03 (0,33-3,21)	
Doble línea	2	66,7%	4,73 (0,39-57,70)	0,752

† P-valor de la prueba chi-Cuadrado o f de Fisher para determinar la existencia de diferencias significativas ($p < 0,05$) en la proporción de casos que requieren tratamiento oral