



CIRUGÍA DE PARED  
Y CORTA ESTANCIA

## Estado actual del cierre de pared en cirugía colorrectal. ¿Dónde estamos en el 2021?

Recuerda que nos interesa más lo que se hace habitualmente en vuestra Unidad/Servicio/Hospital.

¿Cuál creéis que es el mejor tipo de sutura para una laparotomía media?

- Sutura continua
- Sutura con puntos sueltos
- Sutura continua más puntos sueltos
- Otras

¿Cuál creéis que es la mejor técnica de sutura en una laparotomía media?

- Sutura por planos
- Sutura en un solo plano
- Otra

¿Creéis que los puntos en masa («puntos totales») tienen utilidad en el cierre de una laparotomía?

- Sí
- No
- Sólo en el contexto de la urgencia

---

- No lo sé

¿Cuál creéis que es la mejor técnica de sutura en una laparotomía transversa?

- Sutura por planos
- Sutura en un solo plano
- Otra

¿Cuál consideráis que es la mejor sutura para el cierre de una laparotomía?

- Sutura absorbible de absorción lenta.
- Sutura absorbible absorción muy lenta
- Sutura no absorbible
- Otra

¿Utilizáis suturas impregnadas de antibiótico (tipo Triclosán)?

- Sí
- No
- En campos contaminados

Calibre de sutura utilizado habitualmente para cierre pared:

- 2
- 1
- 0

---

- 2/0

¿Utilizáis suturas tipo loop habitualmente para cierre pared?

- Si
- No

¿Qué tamaño de aguja utilizáis habitualmente en el cierre de pared?

- 26
- 30
- 37
- 48
- No lo sé

¿Y qué tipo de aguja?

- Aguja de cuerpo cilíndrico y punta roma
- Aguja de cuerpo cilíndrico y punta trocar
- Aguja triangular
- Otra
- No lo sé

En procedimientos laparoscópicos , si se ha usado un trocar  $\geq 10$  mm, ¿cerráis el defecto aponeurótico?

- Sí
- No

---

- Solo si presenta factores de riesgo de eventración asociados

¿En la cirugía laparoscópica que incisiones de asistencia utilizáis con mas frecuencia?

- Laparotomía media
- Laparotomía lateral paramediana
- Laparotomía transversa
- Pfannenstiel
- La incisión de asistencia depende del segmento que se va a resear

¿Conocéis la regla de la sutura del 4:1 para el cierre de una laparotomía media?

- Sí
- No

¿Creéis que se debe aplicar, como mínimo, la regla del 4:1 en el cierre de una laparotomía media?

- Sí
- No
- Sólo en el contexto de la urgencia
- Si, pero no en contexto de la urgencia
- No lo sé

¿Cómo creéis que deben ser las puntadas en el cierre de la laparotomía media?

- A 1 cm o más del borde; separadas 1 o más cm
- A 1 cm o más del borde, pero más juntas (< 1 cm)
- Separadas 1 o más cm, pero cogiendo menos de 1 cm de borde

---

- Pequeñas (< 1cm del borde) y juntas (< 1cm entre puntadas)
- No lo sé. Depende de cada paciente

¿Creéis que añadir una prótesis al cerrar una laparotomía puede disminuir la aparición de una eventración?

- Sí
- No
- Sólo en el contexto de la urgencia
- No lo sé

¿Utilizáis malla profláctica en el cierre laparotómico?

- Nunca
- En cirugía electiva, en pacientes de riesgo elevado
- Solo en la laparotomía de urgencias
- En cirugía electiva de pacientes de riesgo y en urgencias

¿Utilizáis malla profiláctica tras el cierre de un estoma temporal?

- Nunca
  - Solo en pacientes de riesgo elevado
  - Siempre
- 

¿Colocáis malla profiláctica en la confección de un estoma definitivo?

- Nunca
- Solo en pacientes de riesgo elevado
- Siempre

¿Qué método utilizáis para prevenir la hernia incisional/evisceración en pacientes de riesgo elevado?

- Malla
- Puntos totales
- Sistemas de retención (Ventrofil® o similar)
- Ninguno, con una buena técnica de cierre es suficiente

¿Qué técnica utilizáis para la reparación de la evisceración postoperatoria?

- Sutura continua
- Sutura continua + puntos totales
- Sutura continua+ sistemas de retención
- Malla solo si el terreno no está contaminado
- Malla siempre

¿Quién realiza habitualmente el tiempo del cierre de la laparotomía?

- El mismo cirujano que ha hecho toda la intervención
  - El ayudante y el cirujano ayuda al cierre
  - Suelen encargarse los residentes
- 

Y en la urgencia, ¿quién cierra la laparotomía?

- El mismo cirujano que ha hecho toda la intervención
- El ayudante y el cirujano ayuda al cierre
- Suelen encargarse los residentes

¿Cuál crees que es el porcentaje de aparición de una eventración tras una laparotomía media en tu Unidad/Sección?

- 5-10 %
- 10-20 %
- > 20 %
- No lo sé

## Comunidad Autónoma

- Andalucía
  - Aragón
  - Principado de Asturias

---

  - Illes Balears
  - Canarias
  - Cantabria
  - Castilla-La Mancha
  - Castilla y León
  - Cataluña
  - Comunidad Valenciana
  - Extremadura
  - Galicia
  - Comunidad de Madrid
  - La Rioja
  - Región de Murcia
  - Comunidad Foral de Navarra
  - País Vasco o Euskadi
  - Ciudades Autónomas (Ceuta o Melilla)
-