

## Material Suplementario

**Tabla 1:** Comparación de las características de los pacientes en función de las cohortes del registro incluidas y no incluidas.

	<b>EAHFE 1-3</b> N=512 n (%)	<b>EAHFE 4-6</b> N=1431 n (%)
<b>DATOS EPIDEMIOLÓGICOS</b>		
Edad >80 años	292 (59)	1004 (72)
Sexo femenino	313 (61)	876 (61)
<b>COMORBILIDADES</b>		
Hipertensión arterial	428 (84)	1231 (86)
Diabetes mellitus	227 (45)	621 (43)
Cardiopatía isquémica	141 (28)	344 (24)
Enfermedad renal crónica (creatinina>2 mg/dL)	106 (21)	443 (31)
Enfermedad cerebrovascular	64 (13)	161 (11)
Fibrilación auricular	227 (45)	677 (47)
Valvulopatía	91 (18)	289 (20)
Enfermedad arterial periférica	21 (4)	103 (7)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	115 (23)	380 (26)
Episodios previos de insuficiencia cardiaca aguda	366 (76)	1021 (72)
<b>TRATAMIENTO CRÓNICO EN DOMICILIO</b>		
Beta-bloqueante	170 (34)	624 (44)
Inhibidores del sistema renina-angiotensina	300 (59)	735 (52)
Antagonistas de receptores mineralcorticoides	88 (17)	199 (14)
Digoxina	97 (19)	143 (10)
<b>SITUACIÓN BASAL</b>		
Clase NYHA III/IV	201 (43)	411 (30)
Índice de Barthel (puntos) [media (DE)] <sup>1</sup>	70 (30)	73 (26)
FEVI (%) [media (DE)] <sup>2</sup>	49 (16)	53 (14)
<b>GRAVEDAD DEL EPISODIO DE DESCOMPENSACIÓN</b>		
Escala MEESSI3		
Riesgo bajo	71 (27)	293 (30)
Riesgo intermedio	110 (42)	462 (47)
Riesgo alto/muy alto	82 (31)	221 (23)

\*EAHFE 1-3: 5 hospitales durante 1 mes en 2007 y 2 meses en 2009 y 2011; EAHFE 4-6: 6 hospitales durante 2 meses en 2014, 2016 y 2018. <sup>1</sup>46 pacientes perdidos en EAHFE 1-3 y 73 pacientes perdidos en EAHFE 4-6; <sup>2</sup>362 pacientes perdidos en EAHFE 1-3 y 610 pacientes perdidos en EAHFE 4-6; <sup>3</sup>284 pacientes perdidos en EAHFE 1-3 y 455 pacientes perdidos en EAHFE 4-6.