

Material Suplementario

Tabla 1: Comparación de las características de los pacientes en función de las cohortes del registro incluidas y no incluidas.

	EAHFE 1-3 N=512 n (%)	EAHFE 4-6 N=1431 n (%)
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS		
Edad >80 años	292 (59)	1004 (72)
Sexo femenino	313 (61)	876 (61)
COMORBILIDADES		
Hipertensión arterial	428 (84)	1231 (86)
Diabetes mellitus	227 (45)	621 (43)
Cardiopatía isquémica	141 (28)	344 (24)
Enfermedad renal crónica (creatinina>2 mg/dL)	106 (21)	443 (31)
Enfermedad cerebrovascular	64 (13)	161 (11)
Fibrilación auricular	227 (45)	677 (47)
Valvulopatía	91 (18)	289 (20)
Enfermedad arterial periférica	21 (4)	103 (7)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	115 (23)	380 (26)
Episodios previos de insuficiencia cardiaca aguda	366 (76)	1021 (72)
TRATAMIENTO CRÓNICO EN DOMICILIO		
Beta-bloqueante	170 (34)	624 (44)
Inhibidores del sistema renina-angiotensina	300 (59)	735 (52)
Antagonistas de receptores mineralcorticoides	88 (17)	199 (14)
Digoxina	97 (19)	143 (10)
SITUACIÓN BASAL		
Clase NYHA III/IV	201 (43)	411 (30)
Índice de Barthel (puntos) [media (DE)] ¹	70 (30)	73 (26)
FEVI (%) [media (DE)] ²	49 (16)	53 (14)
GRAVEDAD DEL EPISODIO DE DESCOMPENSACIÓN		
Escala MEESSI3		
Riesgo bajo	71 (27)	293 (30)
Riesgo intermedio	110 (42)	462 (47)
Riesgo alto/muy alto	82 (31)	221 (23)

*EAHFE 1-3: 5 hospitales durante 1 mes en 2007 y 2 meses en 2009 y 2011; EAHFE 4-6: 6 hospitales durante 2 meses en 2014, 2016 y 2018. ¹46 pacientes perdidos en EAHFE 1-3 y 73 pacientes perdidos en EAHFE 4-6; ²362 pacientes perdidos en EAHFE 1-3 y 610 pacientes perdidos en EAHFE 4-6; ³284 pacientes perdidos en EAHFE 1-3 y 455 pacientes perdidos en EAHFE 4-6.