

Tabla 1 suplementaria. Características demográficas de la población adulta china general de 20 años o más en 2015 y los factores de riesgo de EPOC, según GOLD.

	Hombres						Mujeres					
	Total (n=2468)	Sin EPOC (n=2228)	GOLD I (n=158)	GOLD II (n=70)	GOLD III (n=12)	p	Total (n=3168)	Sin EPOC (n=3045)	GOLD I (n=82)	GOLD II (n=35)	GOLD III (n=6)	p
Participantes (%)	100	90,3	6,4	2,8	0,4		100	96,1	2,6	1,1	0,2	
Edad (años)	43,8 (14,0)	42,5 (13,5)	55,1 (11,4)	58,7 (10,8)	62,0 (9,1)	<0,001	46,9 (12,6)	46,6 (12,5)	54,0 (10,1)	57,9 (11,0)	54,3 (15,9)	<0,001
20-39	1086 (44,0%)	1067 (98,3%)	14 (1,3%)	5 (0,5%)	0 (0%)	<0,001	992 (31,3%)	980 (98,8%)	8 (0,8%)	3 (0,3%)	1 (0,1%)	<0,001
40-49	466 (18,9%)	420 (90,1%)	37 (7,9%)	8 (1,7%)	1 (0,2%)		721 (22,8%)	698 (96,8%)	17 (2,4%)	5 (0,7%)	1 (0,1%)	
50-59	502 (20,3%)	436 (86,9%)	43 (8,6%)	20 (4%)	3 (0,6%)		920 (29,0%)	878 (95,4%)	33 (3,6%)	7 (0,8%)	2 (0,2%)	
60-69	343 (13,9%)	264 (77%)	48 (14%)	26 (7,6%)	5 (1,5%)		463 (14,6%)	425 (91,8%)	21 (4,5%)	16 (3,5%)	1 (0,2%)	
≥70	22 (0,9%)	14 (63,6%)	5 (22,7%)	2 (9,1%)	1 (4,5%)		20 (0,6%)	19 (95%)	0 (0%)	1 (5%)	0 (0%)	
Residencia												
En regiones urbanas	2284 (92,5%)	2065 (90,4%)	144 (6,3%)	63 (2,8%)	12 (0,5%)		2896 (91,4%)	2780 (96%)	77 (2,7%)	33 (1,1%)	6 (0,2%)	
En regiones rurales	184 (7,5%)	163 (88,6%)	14 (7,6%)	7 (3,8%)	0 (0%)		272 (8,6%)	265 (97,4%)	5 (1,8%)	2 (0,7%)	0 (0%)	
Nivel educativo												
Educación primaria	218 (8,8%)	165 (75,7%)	29 (13,3%)	19 (8,7%)	52,3%)	<0,001	483 (15,2%)	444 (91,9%)	24 (5%)	14 (2,9%)	1 (0,2%)	<0,001
Educación secundaria y bachillerato	1499 (60,7%)	1339 (89,3%)	108 (7,2%)	45 (3%)	7 (0,5%)		1952 (61,6%)	1874 (96%)	56 (2,9%)	18 (0,9%)	4 (0,2%)	
Educación técnica y universitaria	751 (30,4%)	724 (96,4%)	21 (2,8%)	6 (0,8%)	0 (0%)		733 (23,1%)	727 (99,2%)	2 (0,3%)	3 (0,4%)	1 (0,1%)	
Fumador												
Sí	1732	1538 (88,8%)	128 (7,4%)	56 (3,2%)	10 (0,6%)	p=0,002	99	84 (84,8%)	9 (9,1%)	5 (5,1%)	1 (1,0%)	<0,0001
No	736	690 (93,8%)	30 (4,1%)	14 (1,9%)	2 (0,3%)		3069	2961 (96,5%)	73 (2,4%)	30 (1,0%)	5 (0,2%)	
Antecedentes de tabaquismo												
Nunca	771 (31,2%)	720 (93,4%)	33 (4,3%)	16 (2,1%)	2 (0,2%)	<0,01	3072 (97,0%)	2963 (96,5%)	74 (2,4%)	30 (1%)	5 (0,2%)	<0,001
Exfumador	1468 (59,5%)	1314 (89,5%)	102 (6,9%)	44 (3%)	8 (0,5%)		72 (2,3%)	63 (87,5%)	7 (9,7%)	2 (2,8%)	0 (0%)	
Fumador	229 (9,3%)	194 (84,7%)	23 (10%)	10 (4,4%)	2 (0,9%)		24 (0,8%)	19 (79,2%)	1 (4,2%)	3 (12,5%)	1 (4,2%)	

Fumador pasivo en el domicilio												
Sí	1838 (74,5%)	1662 (90,4%)	118 (6,4%)	51 (2,8%)	7 (0,4%)	p=0,778	3072 (97,0%)	2963 (96,5%)	74 (2,4%)	30 (1%)	5 (0,2%)	0,866
No	602 (24,4%)	542 (90%)	38 (6,3%)	18 (3%)	4 (0,7%)		96 (3,0%)	82 (85,4%)	8 (8,3%)	5 (5,2%)	1 (1%)	
Exposición al tabaco (paquete por año)												
0	803 (32,5%)	662 (82,4%)	86 (10,7%)	47 (5,9%)	8 (1%)	<0,001	32 (1,0%)	24 (75%)	1 (2,8%)	2 (6,2%)	1 (3,1%)	<0,001
1~9	471 (19,1%)	456 (96,8%)	10 (2,1%)	4 (0,8%)	1 (0,2%)		36 (1,1%)	32 (88,9%)	2 (11,1%)	3 (8,3%)	0 (0%)	
10~19	310 (12,6%)	282 (91%)	25 (8,1%)	3 (1%)	0 (0%)		18 (0,6%)	16 (88,9%)	74 (2,4%)	0 (0%)	1 (0%)	
≥20	884 (35,8%)	828 (93,7%)	37 (4,2%)	16 (1,8%)	3 (0,3%)		3082 (97,3%)	2973 (96,5%)	82 (2,6%)	30 (1%)	5 (0,2%)	
Fumadores en el domicilio												
0	1460 (59,2%)	1320 (90,4%)	91 (6,2%)	40 (2,7%)	9 (0,6%)	p=0,704	1275 (40,2%)	1234 (96,8%)	28 (2,2%)	12 (0,9%)	1 (0,1%)	0,255
1	846 (34,3%)	759 (89,7%)	60 (7,1%)	26 (3,1%)	1 (0,1%)		1641 (51,8%)	1572 (95,8%)	44 (2,7%)	21 (1,3%)	4 (0,2%)	
≥2	157 (6,4%)	144 (91,7%)	7 (4,5%)	4 (2,5%)	2 (1,3%)		242 (7,6%)	230 (95%)	9 (3,7%)	2 (0,8%)	1 (0,4%)	
Tos crónica en la infancia (edad ≤14 años)												
Frecuente	55 (2,2%)	43 (78,2%)	5 (9,1%)	6 (10,9%)	1 (1,8%)	0,011	118 (3,7%)	101 (85,6%)	9 (7,6%)	7 (5,9%)	1 (0,8%)	<0,001
Ocasional	181 (7,3%)	163 (90,1%)	10 (5,5%)	6 (3,3%)	2 (1,1%)		214 (6,8%)	204 (95,3%)	6 (2,8%)	3 (1,4%)	1 (0,5%)	
Infrecuente	2225 (90,2%)	2016 (90,6%)	143 (6,4%)	57 (2,6%)	9 (0,4%)		2827 (89,2%)	2731 (96,6%)	67 (2,4%)	25 (0,9%)	4 (0,1%)	
Antecedentes de neumonía o bronquitis en la infancia												
Sí	147 (6,0%)	129 (87,7%)	8 (5,4%)	7 (4,8%)	3 (2%)	p=0,014	202 (6,4%)	182 (90,1%)	8 (4%)	10 (5%)	2 (1%)	<0,001
No	1981 (80,3%)	1805 (91,1%)	122 (6,2%)	49 (2,5%)	5 (0,3%)		2575 (81,3%)	2489 (96,7%)	64 (2,5%)	20 (0,8%)	2 (0,1%)	
Desconocido	337 (13,7%)	291 (86,4%)	28 (8,3%)	14 (4,2%)	4 (1,2%)		385 (12,2%)	368 (95,6%)	10 (2,6%)	5 (1,3%)	2 (0,5%)	
Antecedentes familiares de enfermedades respiratorias												
	2468 (100%)	2228 (0,3%)	158 (6,4%)	70 (2,8%)	12 (0,4%)	p=0,422	3168 (100%)	3045 (96,1%)	82 (2,6%)	35 (1,1%)	6 (0,2%)	0,242
Historial de espirometrías												
Sí	2441 (98,9%)	2206 (90,4%)	153 (6,3%)	70 (2,9%)	11 (0,5%)	p=1,000	3131 (98,8%)	3010 (96,1%)	80 (2,6%)	35 (1,1%)	6 (0,2%)	0,197
No	11 (0,4%)	10 (90,9%)	1 (9,1%)	0 (0%)	0 (0%)		21 (0,7%)	19 (90,5%)	2 (9,5%)	0 (0%)	0 (0%)	

IMC (kg/m ²)	25,16 (3,78)	25,20 (3,75)	24,82 (4,25)	25,19 (3,80)	22,70 (3,07)		24,61 (3,78)	24,61 (3,78)	24,33 (3,02)	25,55 (4,50)	26,46 (5,02)	
<18,5	58	54 (93,1%)	2 (3,4%)	0	2 (3,4%)	p=0,001	103	99 (96,1%)	3 (2,9%)	1 (1,0%)	0	0,300
18,5~24,9	1176	1044 (88,8%)	93 (7,9%)	31 (2,6%)	8 (0,7%)		1683	1623 (96,4%)	41 (2,4%)	16 (1,0)	3 (0,2%)	
25,0~29,9	987	903 (91,5%)	48 (4,9%)	34 (3,4%)	2 (0,2)		1126	1074 (95,4%)	35 (3,1%)	16 (1,4)	1 (0,1%)	
≥30	247	227 (91,9%)	15 (6,1%)	5 (2,0)	0		256	249 (97,3%)	3 (1,2%)	2 (0,8)	2 (0,8%)	
Uso de biomasa												
Sí	134 (5,6%)	118 (5,5%)	11 (7,2%)	5 (7,4%)	0 (0)	p=0,768	184 (6,0%)	172 (5,9%)	11 (13,8%)	1 (3,1%)	0	0,024
No	2254 (94,4%)	2040 (94,5%)	141 (92,8%)	63 (92,6%)	10 (100)		2864 (94,0%)	2758 (94,1%)	69 (86,2%)	31 (96,2%)	6 (100,00)	
Exposición media anual PM 2,5 (µg/m ²)												
<50	0	0	0	0	0	P=0,039	67,99 (4,35)	67,99 (4,35)	66,74 (4,42)	68,64 (4,60)	65,17 (4,13)	0,773
50~74	2270 (92,0)	2060 (90,7)	138 (6,1)	60 (2,6)	11 (0,5)	p=0,012	2808 (88,6)	2700 (96,2)	71 (2,5)	31 (3,1)	6 (0,2)	0,771
≥75	198 (8,0)	168 (84,8)	20 (10,1)	10 (5,1)	0		360 (11,4)	345 (95,8)	11 (3,1)	4 (1,1)	0	
FEV ₁ (L)	3,39 (0,71)	3,49 (0,64)	2,86 (0,53)	1,96 (0,43)	1,06 (0,17)	<0,001	2,48 (0,48)	2,48 (0,48)	2,08 (0,44)	1,34 (0,34)	0,94 (0,38)	<0,001
FVC (L)	4,35 (0,78)	4,38 (0,76)	4,46 (0,78)	3,50 (0,72)	2,62 (0,46)	<0,001	3,08 (0,54)	3,08 (0,54)	3,13 (0,56)	2,33 (0,48)	2,13 (0,54)	<0,001
Después del uso de broncodilatador FEV ₁ /FVC	80,29 (8,31)	82,22 (5,55)	65,87 (3,95)	57,42 (8,95)	46,37 (7,97)	<0,001	83,20 (6,84)	83,20 (6,84)	65,76 (4,10)	58,37 (8,37)	46,85 (13,42)	<0,001
Antecedentes de tuberculosis												
Sí	42 (17,1%)	36 (85,7%)	3 (7,1%)	1 (2,4%)	2 (4,8%)	p=0,001	77 (2,4%)	75 (97,4%)	2 (2,6%)	0	0	0,792
No	2421 (82,9%)	2187 (90,3%)	155 (6,4%)	69 (2,9%)	10 (0,4%)		3087 (97,6%)	2966 (96,1%)	80 (2,6%)	35 (1,1%)	6 (0,2%)	

Los datos se expresan en porcentaje (%) o media (DE). El estadio GOLD I (EPOC leve): FEV1 ≥80% estimado; estadio GOLD II (EPOC moderado): FEV1 ≥50% a <80% estimado; estadio GOLD III (EPOC grave): FEV1 ≥30% a <50% estimado; estadio GOLD IV (muy grave): FEV1 <30% estimado.

*Se han combinado los grupos de edad de 20–29 y 30–39 años por el número pequeño de los estadios GOLD III–IV.

†Uno o más fumadores conviven en el mismo domicilio.

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FVC: capacidad vital forzada; FEV₁: volumen espiratorio forzado en el primer Segundo; GOLD: Iniciativa Global para la

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (*Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease*); IC: intervalo de confianza; IMC: índice de masa corporal; PM 2,5: partículas ambientales de diámetro inferior a 2,5 μm .

Tabla 2 suplementaria. Prevalencia de la EPOC normalizada por la edad y específica de la edad, definida por espirometría, en la población adulta de más de 20 años de la provincia de Shanxi en 2015.

		Prevalencia (%) en toda la población (IC 95%)						Prevalencia (%) en no fumadores (IC 95%)					
		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
		Prevalencia (%)	IC 95%	Prevalencia (%)	IC 95%	Prevalencia (%)	IC 95%	Prevalencia (%)	IC 95%	Prevalencia (%)	IC 95%	Prevalencia (%)	IC 95%
Edad (años)		9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,1	6,3%	4,6~8,1	4,1%	3,4~4,7	4,4%	3,8~5,0
	20-39	1,7%	1,0~2,5	1,2%	0,5~1,9	1,5%	1,0~2,0	2,0%	0,6~3,4	1,4%	0,8~2,1	1,6%	1,0~2,2
	40-49	9,9%	7,2~12,6	3,2%	1,9~4,5	5,8%	4,5~7,1	7,1%	2,6~11,6	3,7%	2,4~5,0	4,2%	2,9~5,4
	50-59	13,1%	10,2~16,1	4,6%	3,2~5,9	7,6%	6,2~9,0	9,8%	4,5~15,2	5,2%	3,8~6,5	5,7%	4,3~7,0
	60-69	23,0%	18,6~27,5	8,2%	5,7~10,7	14,5%	12,1~17,0	15,3%	8,5~22,1	8,8%	6,4~11,2	9,9%	7,6~12,2
	≥70	36,4%	14,5~58,2	5,0%	5,5~15,5	21,4%	8,5~34,4	40,0%	28,0~100,0	13,0%	1,8~27,9	17,9%	2,7~33,0
	Tendencia de p	p<0,0001		p<0,0001		p<0,0001		p<0,0001		p<0,0001		p<0,0001	
Residencia		9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,7	6,4%	5,8~7,1	6,6%	4,9~8,4	3,5%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8
	En regiones urbanas	9,6%	8,4~10,8	4,0%	3,3~4,7	6,5%	5,8~7,1	6,6%	4,8~8,5	3,6%	2,9~4,3	4,2%	3,6~4,9
	En regiones rurales	11,4%	6,8~16,1	2,6%	0,7~4,5	6,1%	3,9~8,4	6,3%	0,2~12,5	2,6%	0,7~4,6	3,4%	1,4~5,3
	Diferencia de p	p=0,422		p=0,242		p=0,785		p=0,929		p=0,401		p=0,443	
Nivel educativo		9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,1	6,6%	4,9~8,4	3,5%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8
	Educación primaria	24,3%	18,6~30,1	8,1%	5,6~10,5	13,1%	10,6~15,6	13,5%	3,9~23,1	6,8%	4,4~9,1	7,5%	5,1~9,8
	Educación secundaria y bachillerato	10,7%	9,1~12,2	4,0%	3,1~4,9	6,9%	6,1~7,7	8,5%	5,8~11,1	3,9%	3,1~4,8	4,7%	3,9~5,6
	Educación técnica y universitaria	3,6%	2,3~4,9	0,8%	0,2~1,5	2,2%	1,5~3,0	3,0%	1,0~4,9	0,7%	0,1~1,3	1,4%	0,6~2,1
	Tendencia de p	p<0,0001		p<0,0001		p<0,0001		p=0,002		p<0,0001		p<0,0001	
Antecedentes de tabaquismo		9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,1	..	..	..	..	..	..
	Nunca	6,6%	4,9~8,4	3,5%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8	..	..	..	..	..	..
	Exfumador	10,5%	8,9~12,1	12,5%	4,7~20,3	10,6%	9,0~12,1	..	..	..	..	..	..
	Fumador	15,3%	10,6~20,0	20,8%	3,3~38,4	15,8%	11,3~20,3	..	..	..	..	..	..
	Tendencia de p	p<0,0001		p<0,0001		p<0,0001		..		..		..	
Exposición al tabaco (paquete por día)		9,4%	8,2~10,5	3,9%	3,8~5,1	6,3%	5,7~6,9	..	..	..	..	..	..
	0	17,6%	14,9~20,2	25,0%	9,1~40,9	17,8%	15,2~20,4	..	..	..	..	..	..

	1~9	3,2%	1,6~4,8	11,1%	0,3~21,9	3,7%	2,1~5,4	..	..	..	..	..	..
	10~19	6,3%	3,5~9,1	11,1%	5,0~27,2	6,6%	3,8~9,3	..	..	..	..	..	..
	≥20	6,3%	4,7~7,9	3,5%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8	..	..	..	..	..	..
	Tendencia de p	p<0,0001		p<0,0001		p<0,0001		..	..	..	..	..	..
Fumadores en el domicilio	..	..	..	..	..	..	..	9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,5	6,4%	5,8~7,1
	0	..	..	..	..	..	..	9,6%	8,1~11,1	3,2%	2,2~4,2	6,6%	5,7~7,6
	1	..	..	..	..	..	..	10,3%	8,2~12,3	4,2%	3,2~5,2	6,3%	5,3~7,2
	≥2	..	..	..	..	..	..	8,3%	3,9~12,6	5,0%	2,2~7,7	6,3%	3,9~8,7
	Tendencia de p	..	..	..	..	..	..	p=0,704		p=0,255		p=0,870	
Tos crónica en la infancia (edad ≤14 años)	9,7%	8,5~10,9	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,1	6,6%	4,9~8,4	5,3%	4,3~6,2	5,6%	4,8~6,5	
	Frecuente	21,8%	10,6~33,1	14,4%	8,0~20,8	16,8%	11,1~22,4	15,8%	2,3~33,8	14,5%	8,0~21,0	14,7%	8,7~20,7
	Ocasional	9,9%	5,5~14,3	4,7%	1,8~7,5	7,1%	4,5~9,6	3,5%	1,4~8,4	4,8%	1,9~7,7	4,5%	2,0~7,0
	Infrecuente	9,4%	8,2~10,6	3,4%	2,7~4,1	6,0%	5,4~6,7	6,6%	4,8~8,5	4,7%	3,7~5,7	5,3%	4,4~6,2
	Tendencia de p	p=0,009		p<0,0001		p<0,0001		p=0,176		p<0,0001		p<0,0001	
Antecedentes de neumonía o bronquitis en la infancia	9,1%	7,9~10,3	3,8%	3,1~4,5	6,1%	5,4~6,8	6,6%	4,9~8,4	3,6%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8	
	Sí	12,2%	6,9~17,6	9,9%	5,7~14,1	10,9%	7,6~14,2	13,6%	3,1~24,2	9,5%	5,4~13,6	10,2%	6,4~14,1
	No	8,9%	7,6~10,1	3,3%	2,6~4,0	5,8%	5,1~6,4	6,0%	4,1~7,9	3,0%	2,3~3,7	3,6%	2,9~4,3
	Desconocida							7,3%	2,3~12,2	4,1%	2,0~6,1	4,8%	2,9~6,7
	Diferencia de p	p=0,172		p<0,0001		p<0,0001		p=0,139		p<0,0001		p<0,0001	
Antecedentes familiares de enfermedades respiratorias	9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,1	6,6%	4,9~8,4	3,5%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8	
Historial de espirometrías	9,6%	8,5~10,8	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,0	6,4%	4,6~8,1	3,6%	2,9~4,2	4,1%	3,5~4,8	
	Sí	9,6%	8,5~10,8	3,9%	3,2~4,5	6,4%	5,7~7,0	6,4%	4,7~8,2	3,5%	2,9~4,2	4,1%	3,5~4,7
	No	9,1%	11,2~29,3	9,5%	4,2~23,2	9,4%	1,3~20,1	0,0%		9,5%	4,2~23,2	7,7%	3,3~18,7
	Diferencia de p (Fisher')	p=1,000		p=0,197		p=0,457		p=1,000		p=0,171		p=0,292	
IMC (kg/m ²)	9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,1	6,6%	4,9~8,4	4,2%	3,5~4,8	0,042	3,5~4,8	
	<18,5 (bajo peso)	6,9%	0,2~13,6	3,9%	0,1~7,7	5,0%	1,6~8,4	5,6%	6,2~17,3	3,3%	0,1~6,6	0,033	0,1~6,6
	18,5-24,9 (peso normal)	11,2%	9,4~13,0	3,6%	2,7~4,5	6,7%	5,8~7,6	7,2%	4,6~9,8	3,9%	3,1~4,8	0,039	3,1~4,8
	25,0-29,9 (sobrepeso)	8,5%	6,8~10,3	4,6%	3,4~5,8	6,4%	5,4~7,5	6,1%	3,4~8,8	4,7%	3,6~5,8	0,047	3,6~5,8
	≥30,0 (obesidad)	8,1%	4,7~11,5	2,7%	0,7~4,7	5,4%	3,4~7,3	6,0%	0,1~11,8	3,6%	1,5~5,7	0,036	1,5~5,7

Tendencia de p		p=0,114		p=0,393		p=0,594		p=0,937		p=0,384		p=0,594	
Uso de biomasa		0,861	84,7~87,5	0,039	3,2~4,6	0,4	38,7~41,3	6,6%	4,8~8,4	3,6%	2,9~4,2	4,1%	3,5~4,8
Sí		0,119	6,4~17,5	0,065	2,9~10,1	0,088	5,7~11,9	9,5%	0,3~18,8	3,6%	2,9~4,2	3,7%	3,0~4,3
No		0,905	89,3~91,7	0,037	3,0~4,4	0,419	40,6~43,3	6,4%	4,6~8,2	2,6%	1,0~6,2	6,0%	4,4~7,7
Diferencia de p		p<0,0001		p=0,055		p<0,0001		p=0,350		p=1,000		p=0,003	
Exposición media anual PM 2,5 (µg/m³)		9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,1	6,6%	4,9~8,4	3,5%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8
<50		0	0	0	0	0		0,0%		0,0%		0,0%	
50-74		9,3%	8,1~10,4	3,8%	3,1~4,6	6,3%	5,6~6,9	6,4%	4,6~8,2	3,5%	2,8~4,2	4,1%	3,5~4,8
≥75		15,2%	10,1~20,2	4,2%	2,1~6,2	8,1%	5,8~10,3	8,8%	1,9~15,7	3,7%	1,7~5,7	4,5%	2,5~6,5
Tendencia de p		p=0,007		p=0,767		p=0,100		p=0,441		p=0,876		p=0,695	
Antecedentes de tuberculosis		9,7%	8,6~10,9	3,9%	3,2~4,6	6,5%	5,8~7,1	6,6%	4,9~8,4	3,6%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8
Sí		14,3%	3,2~25,3	2,6%	1,0~6,2	6,7%	2,2~11,3	10,2%	10,2~50,2	2,6%	1,0~6,2	4,6%	0,1~9,1
No		9,7%	8,5~10,8	3,9%	3,2~4,6	6,4%	5,8~7,1	6,5%	4,7~8,2	3,6%	2,9~4,2	4,2%	3,5~4,8
Diferencia de p		p=0,317		p=0,553		p=0,903		p=0,138		p=1,000		p=0,784	

IC: intervalo de confianza; IMC: índice de masa corporal; PM 2,5: partículas ambientales de diámetro inferior a 2,5 µm.

Tabla 3 suplementaria. OR de ajuste múltiple para la EPOC asociada a factores de riesgo en la población general adulta de 20 años o más en la provincia de Shanxi.

		Toda la población						No fumadores					
		Ajuste por edad y sexo			Ajuste multivariable			Ajuste por edad y sexo			Ajuste multivariable		
		OR		p	OR		p	OR		p	OR		p
Hombres		3,09	2,44~3,92	<0,0001	2,35	1,66~3,32	<0,0001	2,29	1,59~3,28	<0,0001	2,84	1,88~4,28	<0,0001
Edad													
	20-39	1,00			1,00			1,00			1,00		
	40-49	0,05	0,02~0,12	<0,0001	0,07	0,03~0,17	<0,0001	0,09	0,02~0,33	<0,0001	0,12	0,03~0,51	0,004
	50-59	0,25	0,11~0,55	0,001	0,28	0,12~0,63	0,002	0,27	0,08~0,97	0,045	0,30	0,08~1,20	0,088
	60-69	0,35	0,16~0,77	0,009	0,35	0,16~0,79	0,012	0,40	0,11~1,39	0,149	0,46	0,19~1,74	0,25
	≥70	0,68	0,31~1,49	0,336	0,64	0,26~1,45	0,285	0,65	0,18~2,29	0,503	0,70	0,18~2,70	0,605
	Tendencia de p	<0,0001			<0,0001			<0,0001			<0,0001		
Residencia en zonas rurales		0,73	0,47~1,13	0,153	1,55	0,91~2,62	0,107	0,67	0,36~1,27	0,221	1,22	0,58~2,55	0,604
Nivel educativo													
	Educación primaria	1,00			1,00			1,00			1,00		
	Educación secundaria y bachillerato	3,41	2,15~5,41	<0,0001	3,61	2,21~5,88	<0,0001	3,27	1,64~6,54	0,001	4,32	2,04~9,15	<0,0001
	Educación técnica y universitaria	2,20	1,48~3,27	<0,0001	2,17	1,44~3,26	<0,0001	2,66	1,48~4,78	0,001	3,02	1,62~5,62	0,001
	Tendencia de p	<0,0001			<0,0001			p=0,002			p=0,001		
Exposición al tabaco (paquete por años)													
	0	1,00			1,00								

	1~9	0,48	0,35~0,68	<0,0001	0,58	0,405~0,836	0,003						
	10~19	0,43	0,25~0,72	0,001	0,46	0,266~0,789	0,005						
	≥20	0,71	0,45~1,11	0,132	0,78	0,489~1,241	0,293						
Tendencia de p	<0,0001			p=0,004									
Fumadores en el domicilio													
	0	1,00			1,00			1,00			1,00		
	1	0,86	0,55~1,34	0,501	1,09	0,67~1,77	0,722	0,60	0,33~1,10	0,1	0,62	0,32~1,19	0,15
	≥2	1,08	0,68~1,69	0,755	1,12	0,69~1,82	0,637	0,74	0,40~1,34	0,316	0,73	0,39~1,38	0,336
Tendencia de p	p=0,186			p=0,891				p=0,215			p=0,334		
Tos crónica en la infancia (edad ≤14 años)													
	Frecuente	1,00			1,00			1,00			1,00		
	Ocasional	4,68	2,96~7,39	<0,0001	5,40	3,32~8,77	<0,0001	5,81	3,40~9,93	<0,0001	5,05	2,76~9,26	<0,0001
	Infrecuente	1,29	0,83~2,00	0,264	1,29	0,81~2,05	0,294	1,37	0,72~2,61	0,332	1,20	0,60~2,41	0,613
Tendencia de p	<0,0001			<0,0001				<0,0001			<0,0001		
Antecedentes de neumonía y bronquitis en la infancia		2,00	1,26~3,18	0,003	1,48	0,87~2,54	0,152	3,28	1,77~6,06	<0,0001	2,60	1,24~5,44	0,011