

Tabla Suplementaria 1: Características basales de los pacientes con sospecha de HR

Mediciones antropométricas	Pacientes (N=60)
Edad, años (SD)	63,73 (9,77)
Varón, n (%)	41 (68,3)
Índice de masa corporal, kg/m ² (SD)	30,86 (4,22)
Perímetro de cintura, cm (SD)	107,38 (10,23)
PAS en consulta, mmHg (SD)	154,27 (14,41)
PAD en consulta, mmHg (SD)	84,38 (13,67)
Factores de riesgo cardiovascular	
Historia familiar de CVD precoz, n (%)	6 (10)
Evento cardiovascular previo, n (%)	8 (13,3)
Fumador actual, n (%)	12 (20)
Diabetes, n (%)	30 (50)
Dislipidemia, n (%)	39 (65)
Enfermedad renal crónica, n (%)	10 (16,7)
Obesidad, n (%)	35 (58,3)
Lesión de órgano diana	
Hipertrofia ventricular izquierda (ECG), n (%)	18 (30)
Hipertrofia ventricular izquierda (eco), n (%)	23 (38,3)
Tasa de filtración glomerular <60 ml/min, n (%)	11 (18,3)
UACR, mg/gr, n(%)	31(54,4)
Tratamiento antihipertensivo	
Número de fármacos antihipertensivos, n (SD)	3,63 (0,55)
Combinación de dosis fija, n (%)	36 (60)
Combinación de 3 fármacos, n (%)	24 (40)
Combinación de más de 3 fármacos, n (%)	36 (60)
Inhibidores ACE (%)	30
ARB (%)	70
Bloqueadores del canal del calcio (%)	83,3
Diuréticos (%)	90
Antagonistas beta-adrenérgicos (%)	51,7
Antagonistas alfa-adrenérgicos (%)	33,3
Antagonistas del receptor de aldosterona (%)	6,7

Valores medios (DE) excepto para las variables cualitativas, expresadas como n (%). PA: presión arterial; CVD: enfermedad cardiovascular; ECG: electrocardiograma; UACR: ratio albúmina-creatinina en orina.