

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Tabla 1 del material adicional – Resumen de modelos de clases según la intensidad de los síntomas depresivos y ansiosos

Modelo	<i>log-likelihood</i>	Grados de libertad residuales	BIC	AIC	ABIC	cAIC	Entropía
Modelo 1	– 1.283,289	31	2.616,068	2.582,578	2.590,676	2.624,068	—
Modelo 2	– 1.126,227	22	2.357,619	2.286,453	2.303,661	2.374,619	0,857
Modelo 3	– 1.087,372	13	2.335,586	2.226,745	2.253,064	2.361,586	0,797
Modelo 4	– 1.081,841	4	2.380,200	2.233,682	2.269,111	2.415,200	0,859
Modelo 5	– 1.080,675	–5	2.433,543	2.249,350	2.293,890	2.477,543	0,734
Modelo 6	– 1.081,628	–14	2.491,126	2.269,257	2.322,907	2.544,126	0,597
Modelo 7	– 1.079,798	–23	2.543,142	2.283,597	2.350,017	2.544,126	0,573
Modelo 8	– 1.079,260	–32	2.597,741	2.300,520	2.377,127	2.544,126	0,532
Modelo 9	– 1.078,889	–41	2.652,675	2.317,778	2.404,238	2.544,126	0,527
Modelo 10	– 1.078,894	–50	2.708,361	2.335,789	2.431,348	2.544,126	0,472

ABIC, cAIC: índices modificados por ajuste del número de parámetros; AIC: criterio de Akaike; BIC: índice de información bayesiano.

Tabla 2 del material adicional – Características demográficas según el perfil de clases obtenidas por la intensidad de los síntomas depresivos y ansiosos

Característica	Clase 1	Clase 2	Clase 3
<i>Encuestados, n</i>	274	141	71
<i>Mujeres</i>	213 (77,7)	103 (73,0)	59 (83,1)
<i>Edad (años)</i>	37,55 ± 10,23	36,28 ± 8,62	34,21 ± 7,81
<i>Estado civil</i>			
Casado	90 (34,0)	56 (39,7)	20 (28,2)
Separado	11 (4,2)	10 (7,1)	7 (9,9)
Soltero	103 (38,9)	51 (36,2)	32 (45,1)
Unión libre	60 (22,6)	23 (16,3)	12 (16,9)
Viudo	1 (0,4)	1 (0,7)	0
<i>Escolaridad</i>			
0. Bachiller	4 (1,5)	0	0
1. Técnica	110 (41,5)	55 (39,0)	30 (42,3)
2. Pregrado	66 (24,9)	37 (26,2)	21 (29,6)
3. Especialización	69 (26,0)	38 (27,0)	18 (25,4)
4. Maestría	15 (5,7)	9 (6,4)	2 (2,8)
5. Doctorado	1 (0,4)	2 (1,4)	0
<i>Nivel socioeconómico</i>			
Alto	53 (19,3)	29 (20,6)	17 (23,9)
Bajo	24 (8,8)	13 (9,2)	7 (9,9)
Medio	188 (68,6)	99 (70,2)	47 (66,2)
Sin dato	9 (3,3)	0	0
<i>Experiencia (años)</i>	12,74 ± 9,20	12,01 ± 7,79	10,66 ± 6,79
<i>Ocupación en institución</i>			
Administrativo	110 (41,5)	48 (34,0)	20 (28,2)

Característica	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Enfermeros	90 (34,0)	56 (39,7)	27 (38,0)
Médicos	40 (15,1)	29 (20,6)	17 (23,9)
Otro personal asistencial	25 (9,4)	8 (5,7)	7 (9,9)
Trabaja horas nocturnas	123 (46,4)	69 (48,9)	37 (52,1)

Los valores expresan n (%) o media \pm desviación estándar.

Tabla 3. del material adicional – Antecedentes según el perfil de las clases obtenidas por la intensidad de los síntomas depresivos y ansiosos

Antecedente	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Encuestados, n	274	141	71
Trastorno depresivo	15 (5,7)	26 (18,4)	20 (28,2)
Trastorno de ansiedad	15 (5,7)	20 (14,2)	25 (35,2)
Otro trastorno psiquiátrico	3 (1,1)	4 (2,8)	6 (8,5)
Toma de psicofármacos	9 (3,4)	15 (10,6)	17 (23,9)
EPOC	18 (6,8)	14 (9,9)	7 (9,9)
Hipertensión arterial	30 (11,3)	21 (14,9)	5 (7,0)
Inmunodeficiencia	6 (2,3)	3 (2,1)	3 (4,2)
Obesidad	56 (21,1)	29 (20,6)	16 (22,5)
Tabaquismo	17 (6,4)	9 (6,4)	5 (7,0)
Número de personas con que convive	2 [1-3]	2 [1-3]	2 [1-3]
Convivencia con adulto mayor	55 (20,8)	32 (22,7)	24 (33,8)
Convivencia con niños	114 (43,0)	68 (48,2)	30 (42,3)
Convivencia con personas en alto riesgo de muerte por COVID-19	77 (29,1)	59 (41,8)	30 (42,3)
Familiar personal de la salud	88 (33,2)	63 (44,7)	24 (33,8)
Cambio de vivienda para evitar contagio	30 (11,3)	28 (19,9)	22 (31,0)
Contacto directo con personas con COVID-19	129 (48,7)	74 (52,5)	45 (63,4)
Equipo de protección adecuado	241 (90,9)	129 (91,5)	64 (90,1)

Antecedente	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Uso de transporte colectivo	131 (49,4)	66 (46,8)	40 (56,3)

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Los valores expresan n (%) o mediana [intervalo intercuartílico].