

Anexo 2. Escala de dificultad de la intubación de Adnet (IDS).

Parámetro	Puntuación
Nº de intentos >1	N ₁
Nº de operadores >1	N ₂
Nº de técnicas alternativas	N ₃
Grado -1 de Cormack	N ₄
Fuerza de tracción necesaria	N ₅
Presión laríngea	N ₆
Movilidad de cuerda vocal	N ₇
Total: IDS=Suma de puntuaciones	N ₁ - N ₇

Normas para calcular la puntuación IDS

N₁ - Cada intento adicional añade 1 pto. ^{[1][1]}_[SEP]

N₂ - Cada operador adicional añade 1 pto. ^{[1][1]}_[SEP]

N₃ - Cada técnica alternativa añade 1 pto.: reposicionamiento del paciente, cambio de materiales (cuchillete, tubo endotraqueal, adición de estilete), cambio de abordaje (nasotraqueal/orotraqueal) o uso de otra técnica (fibroscopia, intubación a través de mascarilla laríngea) ^{[1][1]}_[SEP]

N₄ - Aplicar grado Cormack para el 1^{er} intento oral ^{[1][1]}_[SEP] Para intubación nasal ciega exitosa N₄= 0 ^{[1][1]}_[SEP]

N₅ - Normal = 0, Incrementada = 1

N₆ - No aplicada = 0, Aplicada = 1, La maniobra de Sellick no suma puntuación

N₇- Abducción = 0, aducción = 1 ^{[1][1]}_[SEP]

Intubación imposible: IDS adopta el valor alcanzado antes del abandono de los intentos de intubación

Puntuación IDS	Grado de dificultad
0	Fácil
0 < IDS ≤ 5	Dificultad ligera
5 > IDS	Dificultad de moderada a grande
IDS = ∞	Intubación imposible

