

Material adicional

Quimioterapia neoadyuvante con gemcitabina-cisplatino Vs metotrexato-vinblastina-adriamicina-cisplatino en pacientes con carcinoma urotelial vesical llevados a cistectomía radical: metaanálisis


José Luis Poveda, Rocío Arias Mutis, José Daza, Carlos Velásquez, Wilfredo Donoso, William Fajardo y Cesar González

Hospital Central de la Policía Nacional, Bogotá, Colombia


ANEXO. A continuación se muestra el esquema de análisis de sesgo de cada uno de los artículos incluidos:

Relative efficacy of perioperative gemcitabine and cisplatin versus methotrexate, vinblastine, adriamycin, and cisplatin in the management of locally advanced urothelial carcinoma of the bladder.


1. Relative efficacy of perioperative gemcitabine and cisplatin versus methotrexate, vinblastine, adriamycin, and cisplatin in the management of locally advanced urothelial carcinoma of the bladder (31);




2. Retrospective analysis of clinical outcomes with neoadjuvant cisplatin-based regimens for muscle-invasive bladder cancer (34);




3. A role for neoadjuvant gemcitabine plus cisplatin in muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder: a retrospective experience (33);



4. Neoadjuvant gemcitabine plus cisplatin for muscle-invasive bladder cancer (28);



5. Neoadjuvant chemotherapy with gemcitabine/cisplatin vs. methotrexate/vinblastine/doxorubicin/cisplatin for muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder: a retrospective analysis from the University of Southern California (30);



El consolidado evidencia la posibilidad de sesgo en los estudios incluidos dado que son experiencias no aleatorizadas y no cegadas. Estos son datos que fueron tenidos en cuenta y se han mencionado durante toda la revisión. Sin embargo también se ha mencionado, que esta es toda la evidencia disponible.

	Herramienta de evaluación de sesgo	generación de la secuencia	ocultamiento de la asignación	cegamiento de los participantes y del personal	cegamiento de los evaluadores del resultado	datos de resultados incompletos	notificación selectiva de los resultados
Relative efficacy of perioperative gemcitabine and cisplatin versus methotrexate, vinblastine, adriamycin, and cisplatin in the management of locally advanced urothelial carcinoma of the bladder.	2	2	1	1	1	1	3
Neoadjuvant chemotherapy with gemcitabine/cisplatin vs. methotrexate/vinblastine/doxorubicin/cisplatin for muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder: a retrospective analysis from the University of Southern California.	2	2	1	1	1	1	3
Retrospective analysis of clinical outcomes with neoadjuvant cisplatin-based regimens for muscle-invasive bladder cancer.	1	1	2	2	2	1	1
A role for neoadjuvant gemcitabine plus cisplatin in muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder: a retrospective experience.	1	1	2	2	2	1	1
Neoadjuvant gemcitabine plus cisplatin for muscle-invasive bladder cancer.	2	2	2	2	2	2	2

1: bajo riesgo de sesgo 2: alto riesgo de sesgo 3: riesgo no claro de sesgo