

Tabla suplementaria 1. Respuestas totales, por sexo, profesión y lugar de trabajo al primer bloque de preguntas

		Total		Sexo					Cuál es tu profesión					Hospital o extrahospitalaria				
				Hombre		Mujer		p	Médico		Enfermer		p	Extrahoa		Hospitala		p
		Nº	%	Nº	%	Nº	%		Nº	%	Nº	%		Nº	%	Nº	%	
Tiempo de PCR sin Soporte Vital Básico mayor de	10 minutos	372	37,2	213	38,5	159	35,6	0,736	255	40,1	117	32,1	0,005	205	34,6	167	41,0	0,065
	15 minutos	288	28,8	160	28,9	128	28,6		173	27,2	115	31,6		177	29,8	111	27,3	
	20 minutos	207	20,7	107	19,3	100	22,4		139	21,9	68	18,7		128	21,6	79	19,4	
	25 minutos	26	2,6	13	2,4	13	2,9		15	2,4	11	3,0		21	3,5	5	1,2	
	30 minutos	107	10,7	60	10,8	47	10,5		54	8,5	53	14,6		62	10,5	45	11,1	
Si se han iniciado maniobras de RCP básica y han pasado más de	10 minutos	50	5	32	5,8	18	4,0	0,595	35	5,5	15	4,1	0,036	25	4,2	25	6,1	0,179
	15 minutos	99	9,9	54	9,8	45	10,1		63	9,9	36	9,9		60	10,1	39	9,6	
	20 minutos	289	28,9	164	29,7	125	28,0		203	31,9	86	23,6		159	26,8	130	31,9	
	25 minutos	97	9,7	49	8,9	48	10,7		57	9,0	40	11,0		63	10,6	34	8,4	
	30 minutos	465	46,5	254	45,9	211	47,2		278	43,7	187	51,4		286	48,2	179	44,0	
No realizaría reanimación en mayores de:	80 años	102	10,2	50	9,0	52	11,6	0,373	69	10,8	33	9,1	0,574	50	8,4	52	12,8	0,031
	85 años	105	10,5	57	10,3	48	10,7		72	11,3	33	9,1		56	9,4	49	12,0	
	90 años	117	11,7	62	11,2	55	12,3		74	11,6	43	11,8		78	13,2	39	9,6	
	95 años	23	2,3	10	1,8	13	2,9		16	2,5	7	1,9		11	1,9	12	2,9	
	la edad no es razón para no	653	65,3	374	67,6	279	62,4		405	63,7	248	68,1		398	67,1	255	62,7	
Si presenta enfermedad terminal:	Nunca realizaría RCP	725	72,5	412	74,5	313	70,0	0,029	466	73,3	259	71,2	<0,001	456	76,9	269	66,1	<0,001
	Esperanza de vida de sólo 3	72	7,2	33	6,0	39	8,7		52	8,2	20	5,5		39	6,6	33	8,1	
	Esperanza de vida de sólo 3 a	38	3,8	15	2,7	23	5,1		31	4,9	7	1,9		10	1,7	28	6,9	
	Esperanza de vida de sólo 6 a	71	7,1	46	8,3	25	5,6		53	8,3	18	4,9		34	5,7	37	9,1	
	Siempre realizaría RCP	94	9,4	47	8,5	47	10,5		34	5,3	60	16,5		54	9,1	40	9,8	
Si su situación basal previa es:	Incapacidad leve	27	2,7	16	2,9	11	2,5	0,044	18	2,8	9	2,5	<0,001	15	2,5	12	2,9	0,567
	Incapacidad moderada.	44	4,4	30	5,4	14	3,1		29	4,6	15	4,1		30	5,1	14	3,4	
	Incapacidad moderadamente g	109	10,9	59	10,7	50	11,2		83	13,1	26	7,1		64	10,8	45	11,1	
	Incapacidad grave.	399	39,9	235	42,5	164	36,7		284	44,7	115	31,6		225	37,9	174	42,8	
	Incapacidad total.	225	22,5	106	19,2	119	26,6		140	22,0	85	23,4		138	23,3	87	21,4	
	No depende nunca de su	196	19,6	107	19,3	89	19,9		82	12,9	114	31,3		121	20,4	75	18,4	
Si hay órdenes de no RCP.	Por escrito y me las enseñan.	488	48,8	257	46,5	231	51,7	0,071	260	40,9	228	62,6	<0,001	307	51,8	181	44,5	0,012
	La familia que hay ordenes	79	7,9	42	7,6	37	8,3		56	8,8	23	6,3		54	9,1	25	6,1	
	La familia: no hay nada por	278	27,8	157	28,4	121	27,1		220	34,6	58	15,9		144	24,3	134	32,9	
	La familia: no dijo nada, ellos no	108	10,8	73	13,2	35	7,8		77	12,1	31	8,5		59	9,9	49	12,0	
	No es causa para no iniciar	47	4,7	24	4,3	23	5,1		23	3,6	24	6,6		29	4,9	18	4,4	
En caso de un paciente suicida	Nunca iniciaría maniobras de RCP	32	3,2	19	3,4	13	2,9	0,056	20	3,1	12	3,3	0,256	18	3,0	14	3,4	0,125
	Si tiene voluntades	360	36	181	32,7	179	40,0		241	37,9	119	32,7		199	33,6	161	39,6	
	No es motivo para no iniciar	608	60,8	353	63,8	255	57,0		375	59,0	233	64,0		376	63,4	232	57,0	

Tabla suplementaria 2. Respuestas totales, por sexo, profesión y lugar de trabajo al segundo bloque de preguntas

		Total		Sexo				Cuál es tu profesión						Hospital o extrahospitalaria				
				Hombre		Mujer		p	Médico		Enfermero		p	Extrahoapital		Hospitalaria		p
Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		Nº	%	Nº	%		Nº	%			
¿Realizas maniobras de RCP aun cuando no estarían indicadas?	Casi nunca	479	47,9	285	51,5	194	43,4	0,008	343	53,9	136	37,4	<0,001	259	43,7	220	54,1	0,026
	Pocas veces	334	33,4	175	31,6	159	35,6		203	31,9	131	36,0		211	35,6	123	30,2	
	A veces	132	13,2	68	12,3	64	14,3		77	12,1	55	15,1		86	14,5	46	11,3	
	Muchas	34	3,4	11	2,0	23	5,1		9	1,4	25	6,9		22	3,7	12	2,9	
	Casi siempre	21	2,1	14	2,5	7	1,6		4	0,6	17	4,7		15	2,5	6	1,5	
Presión ambiental.	Casi nunca	267	26,7	172	31,1	95	21,3	0,004	199	31,3	68	18,7	<0,001	124	20,9	143	35,1	<0,00
	Pocas veces	268	26,8	148	26,8	120	26,8		183	28,8	85	23,4		151	25,5	117	28,7	
	A veces	218	21,8	115	20,8	103	23,0		130	20,4	88	24,2		145	24,5	73	17,9	
	Muchas	163	16,3	79	14,3	84	18,8		83	13,1	80	22,0		117	19,7	46	11,3	
	Casi siempre	84	8,4	39	7,1	45	10,1		41	6,4	43	11,8		56	9,4	28	6,9	
Entrenamiento del equipo	Casi nunca	509	50,9	271	49,0	238	53,2	0,228	349	54,9	160	44,0	<0,001	277	46,7	232	57,0	0,021
	Pocas veces	225	22,5	119	21,5	106	23,7		143	22,5	82	22,5		143	24,1	82	20,1	
	A veces	172	17,2	103	18,6	69	15,4		92	14,5	80	22,0		115	19,4	57	14,0	
	Muchas	61	6,1	39	7,1	22	4,9		41	6,4	20	5,5		36	6,1	25	6,1	
	Casi siempre	33	3,3	21	3,8	12	2,7		11	1,7	22	6,0		22	3,7	11	2,7	
Por motivo de docencia	Casi nunca	465	46,5	245	44,3	220	49,2	0,025	314	49,4	151	41,5	0,007	241	40,6	224	55,0	<0,00
	Pocas veces	225	22,5	128	23,1	97	21,7		141	22,2	84	23,1		144	24,3	81	19,9	
	A veces	196	19,6	103	18,6	93	20,8		117	18,4	79	21,7		134	22,6	62	15,2	
	Muchas	76	7,6	55	9,9	21	4,7		49	7,7	27	7,4		49	8,3	27	6,6	
	Casi siempre	38	3,8	22	4,0	16	3,6		15	2,4	23	6,3		25	4,2	13	3,2	
Cuando están haciendo RCP básica personal no sanitario (ambulancia SVB, Cruz Roja, etc.)	Casi nunca	470	47	250	45,2	220	49,2	0,387	316	49,7	154	42,3	0,071	233	39,3	237	58,2	<0,00
	Pocas veces	213	21,3	113	20,4	100	22,4		134	21,1	79	21,7		124	20,9	89	21,9	
	A veces	173	17,3	105	19,0	68	15,2		99	15,6	74	20,3		127	21,4	46	11,3	
	Muchas	84	8,4	50	9,0	34	7,6		55	8,6	29	8,0		60	10,1	24	5,9	
	Casi siempre	60	6	35	6,3	25	5,6		32	5,0	28	7,7		49	8,3	11	2,7	
En niños	Casi nunca	213	21,3	130	23,5	83	18,6	0,003	140	22,0	73	20,1	0,011	99	16,7	114	28,0	<0,00
	Pocas veces	136	13,6	81	14,6	55	12,3		103	16,2	33	9,1		75	12,6	61	15,0	
	A veces	128	12,8	76	13,7	52	11,6		76	11,9	52	14,3		70	11,8	58	14,3	
	Muchas	186	18,6	109	19,7	77	17,2		118	18,6	68	18,7		126	21,2	60	14,7	
	Casi siempre	337	33,7	157	28,4	180	40,3		199	31,3	138	37,9		223	37,6	114	28,0	
En personas jóvenes.	Casi nunca	189	18,9	115	20,8	74	16,6	0,020	131	20,6	58	15,9	<0,001	91	15,3	98	24,1	0,003
	Pocas veces	171	17,1	102	18,4	69	15,4		128	20,1	43	11,8		99	16,7	72	17,7	
	A veces	169	16,9	95	17,2	74	16,6		94	14,8	75	20,6		98	16,5	71	17,4	
	Muchas	183	18,3	105	19,0	78	17,4		121	19,0	62	17,0		118	19,9	65	16,0	
	Casi siempre	288	28,8	136	24,6	152	34,0		162	25,5	126	34,6		187	31,5	101	24,8	
En embarazadas	Casi nunca	199	19,9	112	20,3	87	19,5	0,082	130	20,4	69	19,0	0,041	102	17,2	97	23,8	0,032
	Pocas veces	148	14,8	85	15,4	63	14,1		107	16,8	41	11,3		85	14,3	63	15,5	
	A veces	161	16,1	95	17,2	66	14,8		89	14,0	72	19,8		103	17,4	58	14,3	
	Muchas	159	15,9	97	17,5	62	13,9		100	15,7	59	16,2		106	17,9	53	13,0	
	Casi siempre	333	33,3	164	29,7	169	37,8		210	33,0	123	33,8		197	33,2	136	33,4	

Tabla suplementaria 3 Respuestas por grupos de experiencia y grupos de edad al primer bloque de preguntas

		Experiencia en grupos de años								grupos edad en años									
		Hasta 10		de 11 a 20		más de 20		p		<36		36-41		42-49		>49		p	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%			Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
Tiempo de PCR sin Soporte Vital Básico mayor de	10 minutos	135	33,8	152	39,1	85	40,1	0,042		75	28,4	102	43,0	78	34,4	117	43,0	0,019	
	15 minutos	108	27,1	117	30,1	63	29,7			80	30,3	58	24,5	78	34,4	72	26,5		
	20 minutos	86	21,6	85	21,9	36	17,0			63	23,9	49	20,7	44	19,4	51	18,8		
	25 minutos	13	3,3	6	1,5	7	3,3			9	3,4	4	1,7	8	3,5	5	1,8		
	30 minutos	57	14,3	29	7,5	21	9,9			37	14,0	24	10,1	19	8,4	27	9,9		
Si se han iniciado maniobras de RCP básica y han pasado más de	10 minutos	23	5,8	14	3,6	13	6,1	0,164		11	4,2	11	4,6	10	4,4	18	6,6	0,298	
	15 minutos	33	8,3	45	11,6	21	9,9			22	8,3	22	9,3	20	8,8	35	12,9		
	20 minutos	102	25,6	127	32,6	60	28,3			63	23,9	71	30,0	75	33,0	80	29,4		
	25 minutos	37	9,3	37	9,5	23	10,8			29	11,0	21	8,9	24	10,6	23	8,5		
	30 minutos	204	51,1	166	42,7	95	44,8			139	52,7	112	47,3	98	43,2	116	42,6		
No realizaría reanimación en mayores de:	80 años	42	10,5	41	10,5	19	9,0	0,306		29	11,0	28	11,8	21	9,3	24	8,8	0,289	
	85 años	41	10,3	48	12,3	16	7,5			33	12,5	29	12,2	22	9,7	21	7,7		
	90 años	39	9,8	55	14,1	23	10,8			27	10,2	25	10,5	34	15,0	31	11,4		
	95 años	10	2,5	9	2,3	4	1,9			8	3,0	1	0,4	7	3,1	7	2,6		
	la edad no es razón para no	267	66,9	236	60,7	150	70,8			167	63,3	154	65,0	143	63,0	189	69,5		
Si presenta enfermedad terminal:	Nunca realizaría RCP	274	68,7	307	78,9	144	67,9	0,010		177	67,0	180	75,9	174	76,7	194	71,3	0,160	
	Esperanza de vida de sólo 3 mes	31	7,8	28	7,2	13	6,1			21	8,0	18	7,6	15	6,6	18	6,6		
	Esperanza de vida de sólo 3 a 6	17	4,3	9	2,3	12	5,7			11	4,2	11	4,6	6	2,6	10	3,7		
	Esperanza de vida de sólo 6 a 12	30	7,5	19	4,9	22	10,4			21	8,0	8	3,4	15	6,6	27	9,9		
	Siempre realizaría RCP	47	11,8	26	6,7	21	9,9			34	12,9	20	8,4	17	7,5	23	8,5		
Si su situación basal previa es:	Incapacidad leve	11	2,8	13	3,3	3	1,4	0,009		8	3,0	6	2,5	8	3,5	5	1,8	0,516	
	Incapacidad moderada.	13	3,3	24	6,2	7	3,3			7	2,7	14	5,9	10	4,4	13	4,8		
	Incapacidad moderadamente grave.	41	10,3	46	11,8	22	10,4			28	10,6	27	11,4	26	11,5	28	10,3		
	Incapacidad grave.	141	35,3	164	42,2	94	44,3			96	36,4	86	36,3	96	42,3	121	44,5		
	Incapacidad total.	93	23,3	88	22,6	44	20,8			66	25,0	52	21,9	53	23,3	54	19,9		
	No depende nunca de su	100	25,1	54	13,9	42	19,8			59	22,3	52	21,9	34	15,0	51	18,8		
Si hay órdenes de no RCP.	Por escrito y me las enseñan.	218	54,6	180	46,3	90	42,5	0,064		147	55,7	113	47,7	119	52,4	109	40,1	0,033	
	La familia que hay ordenes por	23	5,8	33	8,5	23	10,8			11	4,2	21	8,9	19	8,4	28	10,3		
	La familia: no hay nada escrito	98	24,6	120	30,8	60	28,3			63	23,9	65	27,4	58	25,6	92	33,8		
	La familia: no dijo nada, ellos no q	41	10,3	41	10,5	26	12,3			30	11,4	29	12,2	22	9,7	27	9,9		
	No es causa para no iniciar	19	4,8	15	3,9	13	6,1			13	4,9	9	3,8	9	4,0	16	5,9		
En caso de un paciente suicida	Nunca iniciaría maniobras de RCP	12	3,0	11	2,8	9	4,2	0,495		6	2,3	10	4,2	5	2,2	11	4,0	0,524	
	Si tiene voluntades anticipadas	138	34,6	137	35,2	85	40,1			97	36,7	79	33,3	78	34,4	106	39,0		
	No es motivo para no iniciar	249	62,4	241	62,0	118	55,7			161	61,0	148	62,4	144	63,4	155	57,0		

Tabla suplementaria 4. Respuestas por grupos de experiencia y grupos de edad al segundo bloque de preguntas

		Experiencia en grupos de años							grupos edad en años									
		Hasta 10		de 11 a		más de		p	<36		36-41		42-49		>49		p	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
¿Realizas maniobras de RCP aun cuando no estarían indicadas?	Nunca o casi	179	44,9	174	44,7	126	59,4	0,005	113	42,8	111	46,8	109	48,0	146	53,7	0,027	
	Pocas veces	138	34,6	139	35,7	57	26,9		88	33,3	78	32,9	91	40,1	77	28,3		
	A veces (50%)	58	14,5	53	13,6	21	9,9		45	17,0	32	13,5	19	8,4	36	13,2		
	Muchas veces	16	4,0	10	2,6	8	3,8		11	4,2	7	3,0	6	2,6	10	3,7		
	Casi siempre	8	2,0	13	3,3	0	0,0		7	2,7	9	3,8	2	0,9	3	1,1		
Presión ambiental.	Nunca o casi	97	24,3	102	26,2	68	32,1	0,281	56	21,2	65	27,4	62	27,3	84	30,9	0,195	
	Pocas veces	103	25,8	105	27,0	60	28,3		79	29,9	50	21,1	61	26,9	78	28,7		
	A veces (50%)	87	21,8	91	23,4	40	18,9		53	20,1	58	24,5	54	23,8	53	19,5		
	Muchas veces	73	18,3	64	16,5	26	12,3		51	19,3	41	17,3	33	14,5	38	14,0		
	Casi siempre	39	9,8	27	6,9	18	8,5		25	9,5	23	9,7	17	7,5	19	7,0		
Entrenamiento del equipo	Nunca o casi	184	46,1	201	51,7	124	58,5	0,032	108	40,9	126	53,2	119	52,4	156	57,4	0,003	
	Pocas veces	93	23,3	95	24,4	37	17,5		72	27,3	42	17,7	58	25,6	53	19,5		
	A veces (50%)	77	19,3	62	15,9	33	15,6		53	20,1	43	18,1	37	16,3	39	14,3		
	Muchas veces	27	6,8	18	4,6	16	7,5		19	7,2	13	5,5	9	4,0	20	7,4		
	Casi siempre	18	4,5	13	3,3	2	0,9		12	4,5	13	5,5	4	1,8	4	1,5		
Por motivo de docencia	Nunca o casi	178	44,6	178	45,8	109	51,4	0,004	103	39,0	123	51,9	99	43,6	140	51,5	0,003	
	Pocas veces	78	19,5	105	27,0	42	19,8		60	22,7	39	16,5	65	28,6	61	22,4		
	A veces (50%)	92	23,1	71	18,3	33	15,6		68	25,8	45	19,0	43	18,9	40	14,7		
	Muchas veces	28	7,0	25	6,4	23	10,8		20	7,6	17	7,2	14	6,2	25	9,2		
	Casi siempre	23	5,8	10	2,6	5	2,4		13	4,9	13	5,5	6	2,6	6	2,2		
Cuando están haciendo RCP básica personal no sanitario (ambulancia SVB, Cruz Roja, etc.) para animarles a que lo hagan en otra situación similar	Nunca o casi	193	48,4	177	45,5	100	47,2	0,016	126	47,7	118	49,8	106	46,7	120	44,1	0,090	
	Pocas veces	88	22,1	89	22,9	36	17,0		58	22,0	42	17,7	61	26,9	52	19,1		
	A veces (50%)	79	19,8	53	13,6	41	19,3		51	19,3	41	17,3	29	12,8	52	19,1		
	Muchas veces	24	6,0	42	10,8	18	8,5		21	8,0	18	7,6	15	6,6	30	11,0		
	Casi siempre (>90%)	15	3,8	28	7,2	17	8,0		8	3,0	18	7,6	16	7,0	18	6,6		
En niños	Nunca o casi	81	20,3	73	18,8	59	27,8	0,059	54	20,5	50	21,1	46	20,3	63	23,2	0,076	
	Pocas veces	44	11,0	60	15,4	32	15,1		29	11,0	21	8,9	43	18,9	43	15,8		
	A veces (50%)	50	12,5	49	12,6	29	13,7		29	11,0	32	13,5	35	15,4	32	11,8		
	Muchas veces	73	18,3	77	19,8	36	17,0		50	18,9	47	19,8	39	17,2	50	18,4		
	Casi siempre	151	37,8	130	33,4	56	26,4		102	38,6	87	36,7	64	28,2	84	30,9		
En personas jóvenes.	Nunca o casi	69	17,3	62	15,9	58	27,4	0,010	46	17,4	41	17,3	39	17,2	63	23,2	0,014	
	Pocas veces	58	14,5	78	20,1	35	16,5		40	15,2	27	11,4	51	22,5	53	19,5		
	A veces (50%)	64	16,0	68	17,5	37	17,5		38	14,4	47	19,8	43	18,9	41	15,1		
	Muchas veces	78	19,5	74	19,0	31	14,6		50	18,9	50	21,1	42	18,5	41	15,1		
	Casi siempre	130	32,6	107	27,5	51	24,1		90	34,1	72	30,4	52	22,9	74	27,2		

En embarazadas	Nunca o casi	81	20,3	70	18,0	48	22,6	0,372	50	18,9	48	20,3	48	21,1	53	19,5	0,157
	Pocas veces	48	12,0	65	16,7	35	16,5		32	12,1	24	10,1	41	18,1	51	18,8	
	A veces (50%)	62	15,5	63	16,2	36	17,0		40	15,2	43	18,1	31	13,7	47	17,3	
	Muchas veces	68	17,0	66	17,0	25	11,8		46	17,4	46	19,4	32	14,1	35	12,9	
	Casi siempre	140	35,1	125	32,1	68	32,1		96	36,4	76	32,1	75	33,0	86	31,6	

Tabla suplementaria 5. Análisis de conglomerados

		Número de conglomerado (cluster)				
		1		2		p
		Número	%	Número	%	
Sexo	Hombre	312	51,7	241	60,7	0,005
	Mujer	291	48,3	156	39,3	
¿Cuál es tu profesión?	Médico	345	57,2	291	73,3	<0,001
	Enfermero	258	42,8	106	26,7	
Hospital o extrahospitalaria	Extrahoapitalaria	394	65,3	199	50,1	<0,001
	Hospitalaria	209	34,7	198	49,9	
Grupos edad	<36	177	29,4	87	21,9	0,001
	36-41	156	25,9	81	20,4	
	42-49	124	20,6	103	25,9	
	>49	146	24,2	126	31,7	
Experiencia en grupos	hasta 10 años	261	43,3	138	34,8	0,002
	de 11 a 20 años	234	38,8	155	39,0	
	más de 20 años	108	17,9	104	26,2	
¿Realizas maniobras de RCP aun cuando no estarían indicadas?	Nunca o casi nunca (<10%)	203	33,7	276	69,5	<0,001
	Pocas veces (25%)	230	38,1	104	26,2	
	A veces (50%)	120	19,9	12	3,0	
	Muchas veces (75%)	29	4,8	5	1,3	
	Casi siempre (>90%)	21	3,5	0	0,0	
Presión ambiental.	Nunca o casi nunca (<10%)	86	14,3	181	45,6	<0,001
	Pocas veces (25%)	148	24,5	120	30,2	
	A veces (50%)	155	25,7	63	15,9	
	Muchas veces (75%)	142	23,5	21	5,3	
	Casi siempre (>90%)	72	11,9	12	3,0	
Entrenamiento del equipo	Nunca o casi nunca (<10%)	211	35,0	298	75,1	<0,001
	Pocas veces (25%)	158	26,2	67	16,9	
	A veces (50%)	147	24,4	25	6,3	
	Muchas veces (75%)	55	9,1	6	1,5	
	Casi siempre (>90%)	32	5,3	1	0,3	
Por motivo de docencia	Nunca o casi nunca (<10%)	198	32,8	267	67,3	<0,001
	Pocas veces (25%)	141	23,4	84	21,2	
	A veces (50%)	163	27,0	33	8,3	
	Muchas veces (75%)	63	10,4	13	3,3	
	Casi siempre (>90%)	38	6,3	0	0,0	
Cuando están haciendo RCP básica personal no sanitario (ambulancia SVB, Cruz Roja, etc.) para animarles a que lo hagan en otra situación similar	Nunca o casi nunca (<10%)	198	32,8	272	68,5	<0,001
	Pocas veces (25%)	122	20,2	91	22,9	
	A veces (50%)	151	25,0	22	5,5	
	Muchas veces (75%)	79	13,1	5	1,3	
	Casi siempre (>90%)	53	8,8	7	1,8	
En niños	Nunca o casi nunca (<10%)	19	3,2	194	48,9	<0,001
	Pocas veces (25%)	8	1,3	128	32,2	
	A veces (50%)	68	11,3	60	15,1	
	Muchas veces (75%)	173	28,7	13	3,3	
	Casi siempre (>90%)	335	55,6	2	0,5	
En personas jóvenes.	Nunca o casi nunca (<10%)	1	0,2	188	47,4	<0,001
	Pocas veces (25%)	10	1,7	161	40,6	
	A veces (50%)	126	20,9	43	10,8	
	Muchas veces (75%)	178	29,5	5	1,3	
	Casi siempre (>90%)	288	47,8	0	0,0	
En embarazadas	Nunca o casi nunca (<10%)	14	2,3	185	46,6	<0,001
	Pocas veces (25%)	13	2,2	135	34,0	
	A veces (50%)	116	19,2	45	11,3	
	Muchas veces (75%)	150	24,9	9	2,3	

	Casi siempre (>90%)	310	51,4	23	5,8	
--	---------------------	-----	------	----	-----	--