

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Tabla a. Estudio comparativo bivariante de variables clínicas y analíticas de los pacientes en función del tiempo del estudio (T0: antes del inicio de sueroterapia y T1: tras las primeras 24 horas de la fluidoterapia).

	T0	T1	p
pH	7,36 (7,31-7,40)	7,39 (7,35-7,40)	0,04
HCO ₃ (mmol/L)	23 (20-24)	24 (21-25)	0,43
pCO ₂ (mmHg)	39 (25-45)	36 (33-42)	0,67
Na (mmol/L)	136 (134-138)	139(137-141)	<0,01
K (mmol/L)	4,2 (3,9-4,8)	4,2 (3,9-4,5)	0,14
Cl (mmol/L)	102 (100-105)	107(105-109)	<0.01
Glucemia (mg/dL)	96 (88-110)	100 (90-113)	0,22
Creatinina (mg/dL)	0,37(0,26-0,58)	0,28(0,21-0,49)	0,01
Urea (mg/dL)	22 (17-31)	13 (9-20)	<0,01
Ácido Úrico	4,8(3,5-6,2)	3,7 (2,8-4,7)	<0,01
FGe	112 (98,44-126,6)	127 (101,1-149,5)	0,03
Anion Gap	17,35 (12,68-24,15)	14,25 (11.90-17,20)	0,04

Los valores se expresan en medianas con rangos p25-p75.

FGe: filtrado glomerular estimado por fórmula Schwartz [actualizada 2009](#).

Gráfico a. Violin plot. **Dispersión y variabilidad de los grupos según el ritmo de fluidoterapia. En el grupo 1 se incluyen aquellos pacientes que en T0 reciben un suero restringido y en el grupo 2 aquellos que recibieron suero a un ritmo $\geq 90\%$ NNBB.**

