

8. El paciente se muestra **inquieto**.

nada en absoluto 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 muy fuerte

Escenario: El paciente permanece tranquilamente sentado.
Fase temprana: El paciente comienza a balbucear sin razón evidente o a balancear ligeramente el cuerpo.
Fase media: El paciente comienza a deambular repentinamente.
Fase tardía: El paciente no está en condiciones de permanecer sentado tranquilamente y muestra fases prolongadas en las que vaga de un lugar a otro y profiere improperios espontáneamente.

9. El paciente muestra alteraciones de comportamiento motivadas por **alucinaciones**.

nada en absoluto 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 muy fuerte

Escenario: El paciente muestra síntomas de alucinaciones/tiene la alucinación de que alguien le está robando dinero o que su propia casa o su pareja le son extraños.
Fase temprana: El paciente está convencido de que alguien le roba dinero.
Fase media: El paciente reacciona con enfado hacia la "falsa" pareja o intenta abandonar el "falso" hogar.
Fase tardía: El paciente reacciona violentamente hacia la "falsa" pareja o en el intento de impedirle abandonar el "falso" hogar.

10. El paciente se muestra **inseguro**.

nada en absoluto 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 muy fuerte

Escenario: El paciente no quiere quedarse solo en una situación no habitual.
Fase temprana: El paciente está agitado a veces o tiene miedo cuando se le deja sólo.
Fase media: El paciente está a menudo tenso, nervioso o tiene miedo si se le deja sólo.
Fase tardía: El paciente tiene a menudo mucho miedo, comienza a llorar o intenta retener a la otra persona.

11. El paciente se comporta **cooperativamente**.

muy bien 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 muy mal/nada en absoluto

Escenario: El paciente debe ir al médico/a dormir.
Fase temprana: Al paciente no le entusiasma tener que ir al médico/a dormir, pero a pesar de ello lo hace.
Fase media: Hay que convencer al paciente de que debe ir al médico/a dormir.
Fase tardía: El paciente se niega con vehemencia a ir al médico/a dormir y apenas se le puede convencer.

12. El paciente es **competente en la vida cotidiana**.

muy bien 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 muy mal/nada en absoluto

Escenario: El paciente quiere vestirse/comer algo.
Fase temprana: El paciente está en condiciones de elegir la ropa/comida con independencia y vestirse/comer.
Fase media: El paciente está en condiciones de ponerse ropa ya preparada/comer comida preparada con independencia.
Fase tardía: El paciente tiene grandes dificultades para vestirse/comer con independencia.

13. El paciente presta atención, muestra **interés por su entorno**.

muy fuerte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 muy débil

Escenario: El paciente se interesa por los sucesos del día (Familia/deportes/bolsa de valores/...).
Fase temprana: El paciente sigue los sucesos del día (...) por la TV/Radio y habla de ellos con los demás.
Fase media: El paciente habla de los sucesos del día (...), si se le habla de ellos.
Fase tardía: Aun cuando se cuente algo al paciente acerca de los sucesos del día (...), a menudo no reacciona.

14. El paciente es **independiente**.

muy fuerte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 nada en absoluto

Escenario: El paciente quiere ir a alguna parte o quiere hacer algo.
Fase temprana: El paciente determina con independencia a dónde desea ir, qué quiere hacer y va/lo hace con algo de ayuda.
Fase media: El paciente necesita que se le avise y ayuda para ir a cualquier parte/ hacer algo.
Fase tardía: El propio paciente apenas puede ir a alguna parte/hacer algo incluso en compañía de otra persona.

15. La calidad de vida del paciente es

muy buena 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 muy mala

16. La carga para la persona a su cuidado es

muy baja 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 muy alta

Suma parcial (2):

Suma parcial (1):

+

La puntuación total se sitúa entre 0 y 160

Puntuación total:

+