

Tabla 1. Subtipos de dolor neuropático y su severidad según NPSI y Breve Inventario del Dolor antes (base) y a las 4 horas después del bolos ITB o placebo y también a los 6-7 meses después de la implantación de bomba de ITB.

Subtipos de dolor neuropático y su severidad conforme al NPSI														
Antes de ITB														
Paciente	Dolor espontaneo	Duración del dolor espontaneo	Dolor paroxístico	Número de ataques de dolor	Alodinia				Disestesia					
1	2.7	continuo	0	0	2.3				0					
2	4.7	1-3h	7.5	> 20	0				4.5					
3	6.3	continuo	4	1-5	4.3				7.5					
Paciente/ bolos de ITB (µg) o placebo (ver Kumru et al, 2018)														
1/ITB-50µg	1.3	continuo	0	0	2.3				0					
2/ITB-50µg	0	<1h	0	0	0				0					
3/placebo	7.3	continuo	2	1-5	4.3				6					
Paciente/ dosis diaria de ITB (µg) mediante bomba implantada														
1/265 µg	2	continuo	2	1-5	0				1.5					
2/175 µg	1	1-3h	3	6-10	0				0					
3/600 µg	0	0	0	0	0				1					
Breve Inventario del Dolor														
	Intensidad máxima	Intensidad mínima	Intensidad media	Intensidad actual	Interferencia con las actividades de la vida diaria							Puntuación total	Medicación	% mejoría del dolor (sin ITB)
					Actividad en general	Estado de animo	Desplazamiento en silla de ruedas	Trabajo	Relaciones con otras personas	Sueño*	Diversión			
Paciente/condición														
1/base	10	2	7	8	6	8	8	8	8	7	6	78	PRG 225mg	25
2/base	9	0	5	1	2	6	4	4	4	6	5	46	GBP 1800mg	30
3/base	9	4	7	7	10	8	6	6	5	5	5	72	GBN 1800mg	10

Paciente/Bolus de ITB o placebo (ver Kumru et al., 2018)														% mejoría del dolor con bolos ITB o placebo
1/ITB bolos	5	3	7	5	4	6	5	5	5	-	6			50
2/ITB bolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0			100
3/placebo	8	4	6	8	10	8	5	6	5	-	5			0
Paciente/ Dosis diaria (μg) de infusión continua de ITB mediante bomba														% mejoría del dolor con la bomba ITB
1/265 μg	3	2	3	3	2	2	0	0	0	2	0	17	PRG 350mg	70
2/175 μg	6	0	2	1	0	2	0	0	0	1	2	14	GBP 1800mg	60
5/600 μg	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	6	GBP 2700mg	80

La puntuación de dolor ha sido calculada conforme a las recomendaciones de la escala NPSI.

Breve Inventario del Dolor: puntuación (0 – 10) se emplea para la evaluación de la severidad en cada condición excepto la medicación y el % de mejoría. La puntuación del sueño* no ha sido incluida por el tiempo limitado a la evaluación del bolus de ITB (4-24h).