

Suplemento online 2: Requisitos y precauciones a tener en cuenta antes de iniciar tratamiento con macrólidos a largo plazo.

- Pacientes con EPOC estable e IBC con 2 o más agudizaciones/año a pesar del tratamiento de base correcto
- Cumplimiento del régimen actual de fármacos y uso adecuado del inhalador
- Ausencia de alergia a los macrólidos
- Intervalo QT corregido <450 ms en electrocardiografía
- Niveles de aminotransferasa <3 veces el límite superior del rango normal
- Ausencia de disminución de la audición (en caso de duda, llevar a cabo una audiometría formal)
- Cultivo de esputo negativo para micobacterias
- Ausencia de situaciones arritmogénicas¹:
 - Prolongación del intervalo QT congénito o confirmado
 - Tratamiento prolongado con fármacos que prolonguen el intervalo QT:
 - Antiarrítmicos de clase IA (quinidina y procainamida)
 - Antiarrítmicos de clase III (dofetilida, amiodarona y sotalol)
 - Cisaprida
 - Terfenadina
 - Antipsicóticos como fenotiazidas y pimozida
 - Antidepresivos como citalopram
 - Fluoroquinolonas como moxifloxacino y levofloxacino
 - Alteraciones electrolíticas como hipopotasemia o hipomagnesemia.
 - Bradicardia clínicamente relevante, arritmia cardíaca o insuficiencia cardíaca grave

¹Azitromicina 500. Ficha técnica. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2019