



Material suplementario

Comparación de escalas de riesgo hemorrágico en pacientes con fibrilación auricular no valvular que inician anticoagulantes orales de acción directa

Tabla 1 del material suplementario

Tasa de hemorragias clínicamente relevantes en función de las puntuaciones de las escalas de riesgo hemorrágico HAS-BLED, ATRIA y ORBIT

Puntuaciones	HAS-BLED			ATRIA			ORBIT		
	<i>Pacientes, n (%)</i>	<i>Eventos, n</i>	<i>Eventos/100 personas-año</i>	<i>Pacientes, n (%)</i>	<i>Eventos, n</i>	<i>Eventos/100 personas-año</i>	<i>Pacientes, n (%)</i>	<i>Eventos, n</i>	<i>Eventos/100 personas-año</i>
0	66 (6,8)	4	3,32	52 (5,4)	3	3,39	239 (24,7)	17	3,95
1	414 (42,7)	33	4,4	250 (25,8)	17	3,70	292 (30,1)	28	5,31
2	322 (33,2)	35	6,62	70 (7,2)	6	5,02	212 (21,9)	25	6,91
3	135 (13,9)	25	12,6	361 (37,3)	41	6,50	90 (9,3)	14	10,28
4	31 (3,2)	4	8,67	63 (6,5)	10	9,68	85 (8,8)	12	9,58
5	1 (0,1)	0	0	20 (2,1)	6	22,71	25 (2,6)	1	2,84
6	—	—	—	114 (11,8)	15	8,92	25 (2,6)	4	14,13
7	—	—	—	31 (3,2)	3	7,61	1 (0,1)	0	0

Tabla 5 del suplementaria

Curvas ROC de los eventos hemorrágicos en función del tipo de anticoagulante

	ABC (IC95%)			p ^a	p ^b	p ^c
	HAS-BLED	ATRIA	ORBIT			
<i>Apixabán</i>						
Hemorragia relevante	0,64 (0,58-0,70)	0,59 (0,53-0,65)	0,57 (0,51-0,63)	0,34	0,11	0,43
Hemorragia digestiva relevante	0,72 (0,66-0,77)	0,75 (0,70-0,80)	0,70 (0,64-0,75)	0,68	0,86	0,24
Hemorragia mayor	0,71 (0,65-0,76)	0,63 (0,57-0,68)	0,63 (0,57-0,69)	0,36	0,26	0,92
Hemorragia digestiva mayor	0,73 (0,68-0,78)	0,75 (0,70-0,80)	0,67 (0,61-0,73)	0,84	0,56	0,05
<i>Rivaroxabán</i>						
Hemorragia relevante	0,60 (0,55-0,64)	0,59 (0,55-0,64)	0,58 (0,54-0,63)	0,94	0,71	0,61
Hemorragia digestiva relevante	0,72 (0,68-0,76)	0,68 (0,63-0,72)	0,66 (0,62-0,70)	0,39	0,25	0,52
Hemorragia mayor	0,61 (0,56-0,65)	0,62 (0,58-0,66)	0,58 (0,54-0,63)	0,65	0,57	0,09
Hemorragia digestiva mayor	0,79 (0,75-0,83)	0,74 (0,70-0,78)	0,72 (0,68-0,76)	0,27	0,22	0,43
<i>Dabigatrán</i>						
Hemorragia relevante	0,56 (0,49-	0,54 (0,47-	0,55 (0,48-	0,80	0,88	0,84

	0,63)	0,62)	0,62)			
Hemorragia digestiva relevante	0,62 (0,55-0,69)	0,63 (0,56-0,70)	0,64 (0,57-0,71)	0,91	0,83	0,80
Hemorragia mayor	0,57 (0,49-0,64)	0,56 (0,48-0,63)	0,54 (0,47-0,62)	0,87	0,76	0,79
Hemorragia digestiva mayor	0,60 (0,53-0,67)	0,61 (0,53-0,68)	0,64 (0,57-0,71)	0,95	0,54	0,60

ABC: área bajo la curva; IC95%: intervalo de confianza del 95%.

^aHAS-BLED frente ATRIA.

^bHAS-BLED frente ORBIT.

^cATRIA frente ORBIT.