



Material suplementario

Causas y predictores de muerte de los pacientes con fibrilación auricular que inician tratamiento con anticoagulantes orales directos

Tabla 1 material suplementario.

Causas de muerte en la población de estudio

	Mortalidad, %	Pacientes, n (%)	Tasa (cada 100 personas-año)
Mortalidad total	100	102 (10,5)	5,85
Mortalidad cardiovascular	33,3	34 (3,5)	1,95
<i>Cardiaca</i>	22,6	23 (2,4)	1,32
Insuficiencia cardiaca	13,7	14 (1,4)	0,80
Muerte súbita/no presenciada	6,9	7 (0,7)	0,40
Infarto agudo de miocardio	2,0	2 (0,2)	0,12
<i>Vascular</i>	6,9	7 (0,7)	0,40
Ictus/embolia	4,9	5 (0,5)	0,29
Hemorragia	2,0	2 (0,2)	0,11
<i>Otras causas cardiovasculares</i>	3,8	4 (0,4)	0,23
Mortalidad de causa no cardiovascular	54,0	55 (5,7)	3,16
<i>Enfermedad neoplásica</i>	20,6	21(2,2)	1,20

<i>Infección/sepsis</i>	15,7	16 (1,7)	0,92
<i>Insuficiencia respiratoria</i>	6,9	7 (0,7)	0,40
<i>Otros</i>	10,8	11 (1,1)	0,64
Indeterminada	12,7	13 (1,3)	0,74

Tabla 2 material suplementario

Porcentaje y tasa de mortalidad en función del anticoagulante

	Rivaroxabán		Dabigatrán		Apixabán	
	n (%)	Tasa*	n (%)	Tasa*	n (%)	Tasa*
Mortalidad total	49 (9,7)	4,96	22 (11,8)	5,94	31 (11,1)	8,04
Mortalidad cardiovascular	17 (3,4)	1,72	9 (4,8)	2,43	8 (2,9)	2,08
Mortalidad de causa no cardiovascular	28 (5,5)	2,83	9 (4,8)	2,43	18 (6,4)	4,67
Mortalidad de causa desconocida	4 (0,8)	0,41	4 (2,1)	1,08	5 (1,8)	1,29

*Cada 100 pacientes-año.

Tabla 3 material suplementario.

Comparación 2 a 2 mediante análisis de riesgos proporcionales de Cox para la predicción de muerte

	R frente a D		A frente a R		A frente a D	
	HR (IC95%)	p	HR (IC95%)	p	HR (IC95%)	p
Mortalidad total	0,71 (0,38-1,33)	0,285	0,82 (0,47-1,41)	0,463	0,87 (0,43-1,75)	0,691
<i>Mortalidad cardiovascular</i>	0,43 (0,16-1,20)	0,106	0,95 (0,34-2,67)	0,928	1,98 (0,61-6,33)	0,252
<i>Mortalidad causa no cardiovascular</i>	1,31 (0,50-3,44)	0,588	0,77 (0,38-1,56)	0,467	0,32 (0, 90-1,11)	0,072

A: apixabán; CKD-EPI: *Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration*; D: dabigatrán; HR: *hazard ratio*; IC95%: intervalo de confianza del 95%; R: rivaroxabán.

HR ajustadas por sexo, edad, fibrilación auricular persistente-permanente, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica y/o asma, accidente cerebrovascular y/o accidente isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, neoplasia previa, hemorragia mayor previa, filtrado glomerular estimado por CKD-EPI (ml/min/1,73 m²), hemoglobina (g/dl), función sistólica de ventrículo izquierdo (%) y enfermedad valvular significativa.