

Material adicional

Tabla 1 del material adicional

Aspectos importantes para intentar mejorar el proceso del paciente con insuficiencia cardiaca avanzada

- ¿Cómo avanzar en el conocimiento sobre el pronóstico de los pacientes con IC?
- ¿Cómo y cuándo retirar fármacos, desactivar desfibriladores implantables o dispositivos de asistencia mecánica circulatoria?
- ¿Debemos cambiar las variables duras de los ensayos clínicos en IC terminal?, ¿Cuáles deben ser?
- ¿Es posible conseguir una toma de decisiones compartida integrando las preferencias del paciente y de la familia a la de los profesionales?
- ¿Cómo mejorar la comunicación entre todos los participantes en el proceso?
- ¿Cómo se puede valorar y disminuir las cargas físicas y psicológicas en los pacientes con IC y sus familias?
- ¿Cuáles deben ser las estrategias de coordinación para mejorar la atención entre los distintos niveles asistenciales?

IC: insuficiencia cardiaca.

Modificada con permiso de Formiga et al.¹.

Tabla 2 del material adicional

Escala de sedación de Ramsay²

Nivel	Descripción nivel de actividad
1	Agitado, angustiado
2	Tranquilo, orientado y colaborador
3	Respuesta a estímulos verbales
4	Respuesta rápida a la presión glabellar o estímulos dolorosos
5	Respuesta perezosa a la presión glabellar o estímulos dolorosos
6	No respuesta

BIBLIOGRAFÍA

1. Formiga F, Fariñas Balaguer O. Terminal heart failure: Continuous care is essential from the onset]. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2019;54:2-4.
2. Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR, Goodwin R. Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. *Br Med J*. 1974;2:656-659.