

Cabrera-Rubio I, et al. Sensibilización durante la asistencia circulatoria de corta duración. Determinantes, tratamiento y pronóstico después del trasplante cardíaco

MATERIAL ADICIONAL

Tabla 1 del material adicional

Características basales de los pacientes del estudio sometidos a trasplante cardíaco después de la asistencia circulatoria con dispositivo de asistencia ventricular temporal

	Total (n = 68)	No sensibilizado s (n = 57)	Sensibilizado os (n = 11)	p
<i>Edad al implante (años)</i>	55,1 ± 9,1	54,5 ± 9,5	56,4 ± 10,6	0,25
<i>Mujeres</i>	10 (14,7)	5 (8,8)	5 (45,5)	0,002
<i>Etiología</i>				0,46
Dilatada	37 (54,4)	31 (54,4)	6 (54,5)	
Post-IAM	20 (29,4)	18 (31,6)	2(18,2)	
Otras	11 (16,2)	8 (14,0)	3 (27,3)	
<i>Diabetes mellitus</i>	14 (20,6)	13 (22,8)	1 (9,1)	0,44
<i>Esternotomía previa</i>	7 (10,3)	5 (8,8)	2 (18,2)	0,32
<i>Tasa de filtrado glomerular (ml/min/m²)</i>	76,9 ± 40,8	79,7 ± 50,9	68,0 ± 16,8	0,45
<i>Tratamiento de sustitución renal durante la asistencia</i>	13 (19,1)	10 (17,5)	3 (27,3)	0,43
<i>ECMO pre-DAV</i>	15 (22,1)	13 (22,8)	2 (18,2)	0,74
<i>BIAC pre-DAV</i>	38 (55,9)	34 (59,6)	4 (36,4)	0,19
<i>Tipo de DAV</i>				1,00
DAVI/DAVD	44 (64,7)	37 (64,9)	7 (63,3)	
BiVAD	24 (35,3)	20 (35,1)	4 (36,4)	
<i>Cambio de cánulas durante la asistencia</i>	18 (26,5)	15 (26,3)	3 (27,3)	1,00

Cabrera-Rubio I, et al. Sensibilización durante la asistencia circulatoria de corta duración. Determinantes, tratamiento y pronóstico después del trasplante cardiaco

<i>Duración de la asistencia (días)</i>	28,2 ± 20,2	28,6 ± 19,4	27,8 ± 28,3	0,35
<i>Transfusiones durante la asistencia</i>				
Concentrados hematíes	9,5 (11,0)	10,0 (11,0)	8,0 (10,0)	0,52
Plasma	3,5 (5,0)	4,0 (5,0)	5,0 (9,0)	0,30
Plaquetas	3,0 (4,0)	3,0 (4,0)	3,0 (6,0)	0,45
Transfusiones totales (suma de unidades transfundidas)	16,5 (16,0)	16,0 (16,5)	19,0 (18,0)	0,87
<i>Número de reintervenciones por hemorragia durante la asistencia</i>	0,0 ± 1,0	1,0 ± 1,0	0,0 ± 1,0	0,39
<i>Pacientes reintervenidos por hemorragia durante la asistencia</i>	33 (48,5)	29 (50,9)	4 (36,4)	0,51
<i>Infección durante la asistencia</i>	48 (78,6)	42 (73,7)	6 (54,5)	0,28

BiVAD: dispositivo de asistencia biventricular; CEC: circulación extracorpórea; ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; DAV: dispositivo de asistencia ventricular; DAVD: dispositivo de asistencia ventricular derecha; DAVI: dispositivo de asistencia ventricular izquierda; IAM: infarto agudo de miocardio.

Los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.