Tabla 1. Diseño y contenidos principales de los estudios incluidos en la revisión

Primer autor, año de publicación	Diseño estudio y muestra	Factor de riesgo identificado	Estrategia preventiva propuesta
Schallom M, 2015	Cuasiexperimental en 200	A los 85 minutos de exposición a la interfaz	A favor del uso de apósitos para
	pacientes de UCI	detectan lesiones	proteger la piel (sobretodo puente
			nasal): films transparentes, siliconas,
			thin foams o hidrocoloides
			Recomiendan la rotación de la
			interfase
			La máscara de elección debería ser la
			facial (mejor tolerada y menos
			lesiones que la máscara oronasal)
			Evaluar estado de la piel mínimo
			cada 12h y cada vez que se recoloca
			la interfaz
			Tiempo mínimo de descanso entre
			aplicaciones: 10 minutos para dejar
			oxigenar la piel
Tayyib N, 2015	Ensayo clínico aleatorizado	No evalúa ninguno	Cambiar regularmente de posición
	en 140 pacientes de UCI		los dispositivos médicos para evitar
			lesiones
			Evaluar piel y mucosas cada 12h y
			cada vez que se recoloque el
Variation N/D 2014	Oh	La maiorita de marca de la DNA tarría de más	dispositivo
Yamaguti WP, 2014	Observacional prospectivo	Los pacientes que presentaron LADM tenían más	Usan apósitos para proteger puentes
	en 375 pacientes de UCI y	número total de aplicaciones de VNI superiores a	nasal
	unidades cuidados intermedios	las 2h que los que no desarrollaron lesiones	La máscara de elección debería ser la
	Internledios	(7,1±13,3 vs 4,4±7,5, P=0,03)	facial porqué provoca menos lesiomnes
		En horas totales VNI, también presentaron	lesionnes
		diferencias significativas (44,6±118,5 horas vs	
		21,8±45,5, P=0,01)	

		A partir de las 26 horas de VNI el riesgo de lesión aumenta 8,62 veces (IC 95% [2,3 – 32,1] Con la máscara oronasal 80,8 (IC 95% [19,6 – 332,6] más veces riesgo de lesión comparado con la facial	
Maruccia M, 2013	Caso clínico	El material de la interfaz debe ser lo máximo maleable posible, para adaptarse al contorno de la cara y nariz	A favor del uso de apósitos hidrocoloides para mejorar la zona de contacto entre máscara y piel No apretar la máscara en exceso para evitar lesiones en zonas con poco tejido subcutáneo como por ejemplo el puente nasal Evaluar la piel cada 3-4 horas para detectar las lesiones en estado precoz
Lemyze M, 2013	Observacional prospectivo en 573 pacientes de UCI y unidades de cuidados intermedios	A las 11 h seguidas de aplicación de la VNI comienzan las lesiones (sensibilidad 84%, especificidad 71%)	Los apósitos no evitan las lesiones en pacientes con más de 12h de exposición de la máscara (53,3% de los pacientes con más de 12h VNI presentan lesiones comparado con 9,5% de los pacientes con menos de 12h) Evaluar la piel siempre que se retira o recoloca la máscara. Un enrojecimiento que no desaparece en 30 minutos se debe considerar grado I Evaluar también las lesiones asociadas al arnés, principalmente en occipital
Ahmad Z, 2013	Casos clínicos	No evalúa ninguno	Valorar el estado basal de la piel del

			paciente para individualizar los cuidados Importante la experiencia del equipo en la selección y talla adecuada de la interfaz. No apretarla contra la cara del paciente Usar apósitos protege la piel Evaluar la piel cada 2 horas
Racca F, 2009	Casos clínicos	No evalúa ninguno	Recomiendan el uso del Helmet cuando el paciente comenta disconfort con otra interfaz y principalmente cuando presenta lesiones que impiden el uso de la máscara facial o oronasal Usar apósitos para proteger el puente nasal Colocar la máscara que permita el paso de 2 dedos entre arnés y cara del paciente
Weng MH, 2008	Ensayo clínico aleatorizado en 90 pacientes de UCI	Factores que alteran el estado basal de la piel: edad avanzada, niveles bajos de hemoglobina y albúmina, alteración de la fórmula leucocitaria	Recomienda el uso de apósitos cuando se utiliza la máscara oronasal porqué evitan el desplazamiento de la máscara por la humedad y/o el peso de la gravedad, evitando tener que apretarla y con ello disminuir la presión-fricción-cizalla sobre el puente nasal
Visscher MO, 2015	Observacional prospectivo en 50 adultos y niños (edades entre [0,1 – 32,5])	Factores relacionados con el material de la interfase: principalmente de plástico y no transpirables. Si fueran por lo menos transpirables o de tejido, disminuiría humedad	Recomiendan el uso de un apósito de espuma de silicona (Mepilex Lite) con 90%/10% apósito hidrocoloide (Vigilon, Bard) para disminuir

		en las zonas de contacto y con ello menos riesgo de lesión	humedad en la piel A favor de la rotación de la interfase para alternar los puntos de presión La máscara oronasal provoca más lesiones profundas en el puente nasal y en las mejillas que la máscara facial Evaluar piel cada 4h en el momento de recolocar la máscara
Munckton K, 2007	Observacional prospectivo en 12 adultos sanos	Factores que alteran el estado basal de la piel: deficiencia de vitamina D, administración de corticoesteroides En modalidad CPAP (sistema Whisperflow, no mecánico) a más nivel de CPAP menos presión sobre el puente nasal porqué la máscara flota sobre la superficie comparado con menores niveles de presión espiratoria	Recomiendan uso de apósitos No hinchar en exceso los cojines de la máscara porqué cuando más aire contienen menos distensibles son, provocando que sean pocos los puntos de presión sobre los que se apoya la máscara. Recomienda el uso del Helmet antes que la máscara oronasal para disminuir presión sobre puente nasal
Royal College of of Physicians, British Thoracic Society, Intensive Care Society, 2008	Guía clínica	No evalúa ninguno	Recomienda el uso de apósitos para disminuir lesiones en puente nasal (sin nivel de evidencia) Recomiendan el uso de la facial durante las primeras 24 horas de VNI (grado de recomendación C) Importante usar los medidores de talla que se comercializan con las interfases
Diez T, 2015	Revisión bibliográfica	No evalúa ninguno	Recomienda el uso de apósitos para disminuir presión y fricción También el uso de cojines hinchables

Black J, 2015	Panel de expertos	Factores relacionados con el material de la interfase: material rígido y no elástico aumenta la fricción sobre la piel y mucosas; arnés con cintas adhesivas para fijar la máscara puede irritar la piel en zonas donde se haya formado edema La humedad aumenta el riesgo de lesiones por maceración de la piel	y soporte en la cabeza para disminuir presión sobre el puente nasal cuando se usa la máscara oronasal, así como no apretar la máscara A favor de la rotación de la interfaz Priorizar el uso de la facial ante la oronasal Recomienda uso de films y apósitos hidrocoloides para absorver la humedad y si no hay humedad, espumas para disminuir la presión. A favor de incorporar cojines hinchables para que el material de la interfaz sea más elástico Evitar poner un nuevo apósito cuando hay lesión porqué solo dañará más la piel. Se debe cambiar de interfaz para rotar los puntos de presión. Importante la experiencia del equipo en la selección y talla adecuada de la interfaz.
Coyer FM, 2013	Observacional prospectivo en 483 pacientes de UCI	No evalúa ninguno	Importante evaluar la piel debajo el dispositivo pero también las mucosas, porqué resultan igual de dañadas.
Apold J, 2012	Observacional transversal en 5 hospitales de Minnesota	Es un factor de riesgo de lesiones la falta de formación del staff en como colocar adecuadamente el dispositivo y cuando apretado debe estar contra la piel para funcionar óptimamente	La prescripción médica de no remover el dispositivo puede retardar la evaluación de la piel y mucosas en contacto con el mismo. Debe individualizarse al paciente y

			formar el staff en el uso del dispositivo en particular
Cooper KL, 2013	Revisión bibliográfica	Es una factor de riesgo la falta de formación de las enfermeras en el uso de los dispositivos	Recomiendan uso de apósitos para disminuir la presión en el puente nasal. A favor de la rotación de la interfaz y de no apretar la misma contra la cara del paciente
Silva RM, 2013	Observacional prospectivo en 245 pacientes de UCI y unidades de cuidados intermedios	La máscara facial se adapta a la cara en el 75,5% de los pacientes comparado con el 80% la máscara oronasal, sin diferencias entre ellas. En los casos en qué la facial no se adapta, en el 30,5% de ellos es por la forma de la nariz.	Falta desarrollar más modelos de máscara facial en función de las formas de la nariz. Recomiendan la facial como primera elección porqué causa menos dolor en el puente nasal.
Holanda MA, 2009	Ensayo clínico no aleatorizado en 24 adultos sanos	No evalúan ninguno	Recomiendan la facial porqué distribuye en más puntos la presión y no provoca tanto dolor sobre el puente nasal como la oronasal, aunque se relaciona con más claustrofobia
Chacur Fh, 2011	Ensayo clínico aleatorizado en 60 pacientes de UCi	La facial es más bien tolerada que la oronasal (87% vs 46%, P<0,001) en una escala de Likert del 0 al 5.	Recomiendan la facial como primera opción por ser mejor tolerada, incluso por delante del Helmet cuando hay lesiones porqué este acumula más dióxido de carbono y se relaciona con deficiente sincronía paciente-ventilador.
Orenay OM, 2013	Caso clínico		Recomiendan no apretar en exceso la máscara porqué es causa de lesiones pero tampoco dejarla demasiado floja porqué aumenta

			demasiado la fuga. Usar apósitos para proteger el puente nasal.
Raurell-Torredà M, 2016	Observacional prospectivo en 387 pacientes de UCI, unidades de cuidados intermedios (urgencias y reanimación posquirúrgica) y salas de hospitalización	El exceso de fuga no intencionada se relaciona con la aparición de lesiones cutáneas (OR 2.4 [IC 95% 1,1 – 5,3]) pues es causa de que se ciña la máscara más fuerte a la cara del paciente (OR 1,1 [IC 95% 1,02 – 1,17]) La máscara oronasal provoca más fuga no intencionada que la facial (OR 3,5 [IC 95% 1,1 – 11,3]) La intolerancia a la interfase se relaciona con el uso de ventiladores convencionales de UCI (OR 4,4 [95% CI 2,1 – 9,2]). El riesgo de lesiones es más alto en aquellas unidades dónde los profesionales opinan mayormente que es correcto apretar la máscara a la cara del paciente para conseguir una mejor sincronización paciente-ventilador (OR 1,1 [IC 95% 1,01 – 1,18]	Indican la máscara facial como la primera opción porqué fuga menos que la oronasal con lo cual las enfermeras no la aprietan contra la cara del paciente. El uso de apósitos no fue significativo en la regresión logística, por lo que no se puede hacer ninguna recomendación

Máscara oronasal o nasobucal: cubre la nariz y la boca / Máscara facial: cubre ojos, nariz y boca

LESADIC: lesiones asociadas a dispositivos clínicos