# $\it Anexo~1$ : Resultado de la encuesta sobre la utilización de determinadas prácticas en atención primaria\*

### 1.1.: Utilización de antibióticos en procesos no indicados.

PREGUNTAS	Muy Raramente (<1% de los casos)	Ocasionalmente (1-10% de los casos)	Con cierta frecuencia (10- 25% de los casos)	Con bastante frecuencia (25- 50% de los casos)	La mayoría de los casos (>50% de los casos)
En su opinión	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
P1. Se prescriben antibióticos ante una risosinusitis no complicada con menos de 7 días de evolución sintomática	40 (18,9%)	44 (20,8%)	59 (27,8%)	44 (20,8)	25 (11,8)
P5. Se prescriben antibióticos para tratar adenoconjuntivitis víricas	62 (29,2 %)	44 (20,8%)	50 (23,6%)	27 (12,7%)	28 (13,2%)
P6. Se prescriben antibióticos por vía oral para tratar episodios de otitis externa no complicada	77 (36,3%)	65 (30,7%)	33 (15,6%)	25 (11,8%)	12 (5,7%)
P7. Se prescriben antibióticos para tratar procesos respiratorios de probable origen viral en niños (sinusitis, faringitis, bronquitis)	45 (21,2%)	65 (30,7%)	55 (25,9%)	36 (17,0%)	7 (3,3%)
P13. Se utilizan antibióticos para tratar bacteriurias asintomáticas en ancianos	36 (17,0%)	66 (31,1%)	47 (22,2%)	39 (18,4%)	22 (10,4%)

### 1.2.: Utilización de pruebas diagnósticas de efectividad dudosa

PREGUNTAS	Muy Raramente (<1% de los casos)	Ocasionalmente (1-10% de los casos)	Con cierta frecuencia (10- 25% de los casos)	Con bastante frecuencia (25- 50% de los casos)	La mayoría de los casos (>50% de los casos)
En su opinión	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
P2. Se realizan pruebas de imagen en los pacientes que acuden a consulta por dolor lumbar en las primeras 6 semanas de evolución, aunque no existan signos de alerta que puedan hacer sospechar una enfermedad basal grave.	43 (20,3%)	80 (37,7%)	41 (19,3%)	34 (16,0)	14 (6,6%)
P9. Se solicitan pruebas de imagen en pacientes con cefalea no complicada	109 (51,4%)	65 (30,7%)	28 (13,2%)	8 (3,8%)	1 (0,5%)

#### 1.3.: Utilización de intervenciones de cribado de forma inadecuada

PREGUNTAS	Muy Raramente (<1% de los casos)	Ocasionalmente (1-10% de los casos)	Con cierta frecuencia (10- 25% de los casos)	Con bastante frecuencia (25- 50% de los casos)	La mayoría de los casos (>50% de los casos)
En su opinión	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
P3. Se solicita densitometría ósea para cribado de osteoporosis en mujeres menores de 65 años o varones < de 70 sin factores de riesgo	113 (53,3%)	66 (31,1%)	23 (10,8%)	7 (3,3%)	3 (1,4%)

PREGUNTAS	Muy Raramente (<1% de los casos)	Ocasionalmente (1-10% de los casos)	Con cierta frecuencia (10- 25% de los casos)	Con bastante frecuencia (25- 50% de los casos)	La mayoría de los casos (>50% de los casos)
P4. Se realizan electrocardiogramas anuales de forma rutinaria en pacientes sin factores de riesgo o sin síntomas sospechosos de patología cardiaca	111 (52,4%	56 (26,4%)	27 (12,7%)	13 (6,1 %)	4 (1,9%)
P15. Se realizan citologías ANUALES de cribado para el cáncer cervical en mujeres entre 30-65 años	72 (34,0%)	46 (21,7%)	41 (19,3%)	25 (11,8%)	25 (11,8%)
P16. Se realiza citología vaginal de cribado para el cáncer de cuello en mujeres menores de 21 años	76 (35,8%)	76 (35,8%)	38 (17,9%)	14 (6,6%)	4 (1,9%)
P17. Se realiza citología vaginal de cribado para el cáncer de cuello en mujeres mayores de 65 años con historia previa de cribado negativa y sin otros factores de riesgo.	94 (44,3%)	69 (32,5%)	25 (11,8%)	17 (8,0%)	3 (1,4%)

## 1.4: Utilización de intervenciones terapéuticas de manera inadecuada.

PREGUNTAS  En su opinión	Muy Raramente (<1% de los casos)	Ocasionalmente (1-10% de los casos)	Con cierta frecuencia (10- 25% de los casos) n (%)	Con bastante frecuencia (25- 50% de los casos) n (%)	La mayoría de los casos (>50% de los casos) n (%)
P8. Se prescriben antitusivos o anticatarrales en menores de 4 años	59 (27,8%)	76 (35,8%)	37 (17,5%)	19 (9,0%)	13 (6,1%)
P10. Se utilizan medicamentos para mantener una hemoglobina glicada menor de 7,5 % en pacientes mayores de 65 años con diabetes tipo II	8 (3,8%)	21 (9,9 %)	38 (17,9%)	68 (32,1%)	77 (36,3%)
P11. Se utilizan benzodiacepinas u otros hipnóticos sedantes como primera elección para tratar el insomnio, la agitación o síntomas delirantes en pacientes adultos	10 (4,7%)	30 (14,2%)	34 (16,0%)	66 (31,1%)	68 (32,1%)
P12. Se prescriben antipsicóticos como primera elección para tratar síntomas psicológicos y de comportamiento relacionados con la demencia	32 (15,1%)	48 (22,6%)	52 (24,5%)	48 (22,6%)	30 (14,2%)
P14. Se prescriben analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, en los casos en los que sea necesaria una analgesia, en pacientes con Hipertensión Arterial, Insuficiencia Renal Crónica o Insuficiencia Cardiaca	28 (13,2%)	51 (24,1%)	57 (26,9%)	59 (27,8%)	17 (8,0%)

<sup>\*</sup> En cada tabla se muestra el número y proporción  $n^{\circ}$  (%) de respuestas a los diferentes ítems de cada pregunta.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 23/08/2025. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.	