

Tabla **S1**. Resultados del cuestionario inicial completado por el panel de expertos.

	n (%)
<i>Distribución geográfica de los expertos</i>	
Galicia	1 (6,7)
País Vasco	1 (6,7)
Aragón	1 (6,7)
Cataluña	3 (20,0)
Comunidad de Madrid	5 (33,3)
Comunidad Valenciana	1 (6,7)
Andalucía	1 (6,7)
Islas Baleares	1 (6,7)
Islas Canarias	1 (6,7)
<i>Lugar donde ejerce su actividad</i>	
Sanidad pública	0 (0)
Sanidad privada	5 (33,3)
Ambas	10 (66,7)
<i>Número medio de pacientes que visita a la semana</i>	
< 30	0 (0)
Entre 30 – 50	1 (6,7)
> 50	14 (93,3)
<i>Número de pacientes que consultan por problemas de rosácea</i>	
0 – 5 por semana	0 (0)
5 – 10 por semana	7 (46,7)
10 – 15 por semana	5 (33,3)
> 15 por semana	2 (13,3)
NS / NC	1 (6,7)
<i>¿Cómo se distribuyen los pacientes con rosácea que acuden a su consulta en función de su gravedad?</i>	
Rosácea leve	50%
Rosácea moderada	38%
Rosácea grave	12%
<i>¿Está de acuerdo con la clasificación de la rosácea en eritematotelangiectásica, papulopustulosa, fimatosa y ocular?</i>	
SI	13 (86,7)
NO	2 (13,3)
<i>¿Qué criterio sigue para determinar el grado de rosácea del paciente?</i>	
Subtipo clínico anterior	10 (66,7)
Número de lesiones (en la papulopustulosa)	1 (6,7)
Impacto sobre la calidad de vida (DLQI)	0 (0)
NS / NC	4 (26,7)

<p><i>¿Es importante para usted el problema de las resistencias antibióticas?</i></p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NS / NC</p>	<p>8 (53,3)</p> <p>4 (26,7)</p> <p>3 (20,0)</p>
<p><i>En su opinión, ¿los tratamientos dermatológicos contribuyen a las resistencias antibióticas?</i></p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>12 (80,0)</p> <p>3 (20,0)</p>
<p><i>¿Cree que el tratamiento de la rosácea es completo en la actualidad?</i></p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>5 (33,3)</p> <p>10 (66,7)</p>

DLQI: Dermatology Quality of Life Index. NS / NC: no sabe / no contesta