

Tabla 1 suplementaria.– Frecuencia de brotes de la enfermedad en los estudios realizados en España sobre lupus eritematoso sistémico y embarazo.

	De la Hera et al	Carmona et al (8)	Cortés-Hernández et al (9)
Definición de brote	Aumento del nivel de la actividad (según la escala SLEPDAI) >4 puntos o cuando se ha considerado necesario, por parte del facultativo a cargo, un aumento de la medicación para control de la enfermedad.	Cuando una manifestación clínica atribuible a la enfermedad aparecía durante el periodo de estudio.	Cuando una manifestación clínica atribuible a la enfermedad requería un cambio en el tratamiento.
Brote embarazo, n (%)	12 (18,8 %)	10 (16,7%)	19 (18,4%)
Brote posparto, n (%)	12 (30,8 %)	5 (8,3 %)	20 (19,4%)

HTA: hipertensión arterial; SAF: síndrome antifosfolípido; HCQ: hidroxicloroquina; AZA: azatioprina

Los porcentajes de brotes en nuestra cohorte están calculados sobre el número de embarazos con datos (54 para brotes durante el embarazo y 39 en el postparto)

Tabla 2 suplementaria.– Tipo de brotes durante el embarazo de acuerdo al momento de aparición y al órgano afectado.

Manifestación	Nº de brotes Embarazo	Nº de brotes Posparto
Cutánea	4	0
Músculo-esquelética	5	1
Manifestaciones generales y/o alteraciones analíticas	1	5
Nefropatía	2	6

Tabla 3 Suplementaria.– Comparativa de los resultados en los pacientes con nefritis lúpica.

	de la Hera et al (n=64)			Carmona et al (n=102)		
	NL (n=11)	No NL (n=53)	p	NL (n=10)	No NL (n=43)	p
Brote embarazo, N° (%)	3 (27,3)	9 (17)	0,11	5 (30)	12 (24)	N.S
HTA, N° (%)	2 (18,2)	1 (1,9)	0,02	5 (50)	5 (11,6)	0,01
Parto prematuro, N° (%)	2 (18,2)	4 (7,5)	0,37	3 (30)	11 (25,5)	N.S
Edad gestacional, media (DE)	36,7 (1,75)	38,1 (1,78)	0,29	35,9 (3,7)	37,3 (4,2)	0,04
Peso RN, media (DE)	2770 (517)	2879 (549)	0,54	2441 (967)	3229 (1747)	N.S

NL: nefritis lúpica; HTA: Hipertensión arterial, RN: recién nacido, DE: desviación estándar, N.S: no significativo