

RIESGO DE FRACTURAS VERTEBRALES DORSALES OSTEOPORÓTICAS EN PACIENTES CON GOTA.

--Material suplementario--

	Radiografía lateral no disponible (n=140)	Radiografía lateral disponible (n=126)	P
Gota	19 (13,6)	21 (16,7)	0,481
Edad (años), mediana (p25-75)	68 (58-77)	71 (62-78)	0,167
Sexo femenino	44 (31,4)	36 (28,6)	0,612
Hipertensión arterial	99 (70,7)	102 (81,0)	0,052
Diabetes mellitus	74 (52,9)	69 (54,8)	0,756
Dislipemia	92 (65,7)	84 (66,7)	0,870
Consumo activo de tabaco	41 (29,3)	29 (23,0)	0,246
Consumo activo de alcohol	26 (18,6)	24 (19,0)	0,921
IMC (kg/m²), mediana (p25-75)	26,9 (24,2-30,6)	27,5 (24,6-30,8)	0,350
Enfermedad renal crónica	37 (26,4)	37 (29,4)	0,594
Uso de diuréticos hiperuricemiantes	51 (36,4)	58 (46,0)	0,112

Tabla 1S. Comparativa entre pacientes con y sin radiografía lateral de tórax disponible para su revisión. Datos mostrados como n (%), salvo especificado lo contrario.