

Tabla S1. Criterios diagnósticos de EMAR según la CAARMS.

Categoría EMAR	Definición
Atenuado	Síntomas que no alcanzan el nivel umbral de psicosis debido a su <i>intensidad subumbral</i> (los síntomas no son lo suficientemente graves) o tienen síntomas psicóticos pero con una <i>frecuencia subumbral</i> (los síntomas no ocurren con la suficiente frecuencia).
Intensidad subumbral	Puntuación en severidad (CAARMS): 3-4 en P1, 3-5 en P2, 3-4 en P3 y/o 4-5 en P4 + Puntuación en frecuencia (CAARMS): 3-6 en P1, P2, P3 y/o P4 de la CAARMS durante al menos 1 semana
Frecuencia subumbral	Puntuación en severidad (CAARMS): 6 en al menos uno de P1, P2, P4 y/o 5-6 en P3 + Puntuación en frecuencia (CAARMS): 3 en P1, P2, P3 y/o P4
Síntomas psicóticos intermitentes (Brief Limitted Intermittent Symptoms, BLIPS)	Puntuación en severidad (CAARMS): 6 en al menos uno de P1, P2, P4 y/o 5-6 en P3 + Puntuación en frecuencia (CAARMS): 4-6 en P1, P2, P3 y/o P4 + Síntomas presentes menos de 7 días con remisión sintomática
Grupo de vulnerabilidad	Trastorno esquizotípico de la personalidad o historia familiar de psicosis en un familiar de primer grado

Nota sobre funcionalidad: Para realizar un diagnóstico debe existir una afectación en la funcionalidad (reducción del 30% en la Escala de Evaluación de la Actividad Global [EEAG] o una puntuación EEAG < 50 puntos).


Abreviaturas: EMAR= Estado mental de alto riesgo; CAARMS= Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States; P1= subescala contenido inusual del pensamiento, P2= subescala ideación no bizarra; P3= subescala anomalías perceptivas, P4= subescala lenguaje desorganizado

Tabla S2. Resultado de las regresiones entre variables latentes y variables dependientes del análisis SEM realizado en 81 pacientes con un PEP.

Regresiones	Estimación	Error Estándar	Valor Z	Valor p
Síntomas positivos (POS)				
Maltrato infantil (MAL)	0.573	0.179	3.207	0.001
Síntomas negativos (NEG)				
Maltrato infantil (MAL)	0.092	0.132	0.699	0.485
Síntomas depresivos (DEP)				
Maltrato infantil (MAL)	0.266	0.125	2.123	0.034
Dominio relaciones extra-familiares de la SASS (AS1)				
Síntomas positivos (POS)	-0.091	0.189	-0.484	0.629
Síntomas negativos (NEG)	-0.306	0.173	-1.774	0.076
Síntomas depresivos (DEP)	-0.266	0.156	-1.706	0.088
Maltrato infantil (MAL)	-0.432	0.247	-1.748	0.080
Dominio ocio y trabajo de la SASS (AS2)				
Síntomas positivos (POS)	-0.012	0.165	-0.071	0.943
Síntomas negativos (NEG)	-0.338	0.152	-2.223	0.026
Síntomas depresivos (DEP)	-0.520	0.153	-3.394	0.001
Maltrato infantil (MAL)	-0.082	0.201	-0.407	0.684
Dominio intereses socioculturales de la SASS (AS3)				
Síntomas positivos (POS)	0.180	0.158	1.136	0.256
Síntomas negativos (NEG)	-0.353	0.144	-2.453	0.014
Síntomas depresivos (DEP)	-0.281	0.130	-2.167	0.030
Maltrato infantil (MAL)	0.119	0.189	0.631	0.528
Dominio relaciones familiares y estrategias conductuales de la SASS (AS4)				
Síntomas positivos (POS)	-0.139	0.233	-0.597	0.551
Síntomas negativos (NEG)	-0.596	0.288	-2.069	0.039
Síntomas depresivos (DEP)	-0.368	0.219	-1.684	0.092
Maltrato infantil (MAL)	-0.728	0.392	-1.854	0.064

Abreviaturas: PEP= Primer episodio psicótico; PANSS= *Positive and Negative Syndrome Scale*; SASS= *Social Adaptation Self-evaluation Scale*.


Figura 1. Relación de las variables clínicas, de maltrato y adaptación social mediante el modelo de ecuaciones estructurales en la submuestra de pacientes con un primer episodio psicótico.



Abreviaturas: MAL= maltrato infantil; DEP= sintomatología depresiva; NEG= síntomas negativos; POS= síntomas positivos; AS1= dominio relaciones extra-familiares de la SASS; AS2=dominio ocio y trabajo de la SASS; AS3= dominio intereses socioculturales de la SASS; AS4= dominio relaciones familiares y estrategias conductuales de la SASS.

La figura describe la relación (parámetros estimados) entre variables latentes que reflejan diferentes dominios de psicopatología, maltrato infantil o adaptación social. Cada variable latente está compuesta por diferentes ítems o escalas tal como se ha definido en el apartado de métodos. Las variables que conforman cada variable latente no se han mostrado en la figura para facilitar la interpretación de los datos.

Figura S2. Relaciones significativas entre maltrato infantil, psicopatología y dimensiones de adaptación social en el modelo de ecuaciones estructurales realizado en la submuestra de pacientes con un primer episodio psicótico.



Se muestran puntuaciones estandarizadas (*z-scores*) de las relaciones entre variables latentes del modelo de ecuaciones estructurales en la submuestra de pacientes con un primer episodio psicótico. Los valores positivos indican asociaciones positivas y los valores negativos relaciones negativas. Dado que las dimensiones de adaptación social están conformadas por ítems de la escala SASS que a mayor puntuación reflejan una mejor adaptación social, los valores negativos de *z-scores* implican asociaciones con una peor funcionalidad social.