

Valoración y manejo del control glucémico en la visita del estudio

Valor de HbA1c en la visita del estudio

□□.□%

¿Qué objetivo individual de HbA1c ha establecido para este paciente?

□□.□%

Si el paciente no ha alcanzado en general su objetivo de HbA1c, por qué cree que es así?
(Marque todo lo que aplica)

- Fallo terapéutico o régimen actual de medicación antihiperglucemias
- Baja adherencia del paciente a la dieta y/o recomendaciones de ejercicio físico
- Baja adherencia del paciente a las recomendaciones de automonitorización de la glucosa en sangre
- Baja adherencia del paciente a las recomendaciones de tomar la medicación antihiperglucemias incluyendo insulina
- Resistencia/rechazo del paciente a intensificar su régimen de medicación (ya sea añadiendo otro agente o aumentando la dosis)
- Rechazo del médico a intensificar el régimen
 - Temor a hipoglucemias
 - Temor a causar una ganancia de peso adicional
 - Temor a causar efectos adversos indeseables incluyendo síntomas gastrointestinales o enema periférico
 - Temor a interacciones con otros medicamentos
 - Coste del tratamiento

Si el paciente no está su objetivo de HbA1c, cuál es la principal acción que tomará respecto a este paciente? (marque todo lo que aplique)

- Abordaje educacional (estilo de vida, dieta, adherencia a la medicación actual)
- Aumento de la actual dosis de medicación antihiperglucemias
- Añadir una nueva medicación antihiperglucemias

Si es así, el agente de elección es: _____ (seleccionar del listado)

- Iniciar terapia con insulina con o sin cambio en la medicación oral para diabetes anterior, si aplica
- Remitir paciente al especialista para consejo adicional
- Otras acciones
- Ninguna acción específica

Episodios de Hipoglucemia:

¿Cuántos episodios de hipoglucemia grave tuvo el paciente en los últimos 12 meses?

□□

“Grave” define un episodio sintomático que requiere asistencia externa debido a grave afectación de la conciencia o comportamiento y rápida recuperación tras la administración de glucosa o glucagón

¿Cuántos episodios de hipoglucemia (aparte de los graves) tuvo el paciente de media al mes?

Si este número es menor de 1,especifique número aproximado al año

De los cuales

- se diagnosticaron sólo por síntomas (resueltos con ingesta de glucosa)
- se diagnosticaron mediante medida de glucosa sólo (concentración de glucosa <3 mmol/L)
- se diagnosticaron mediante medida de glucosa (concentración de glucosa <3 mmol/L) y síntomas