


|                | <i>muestra de pacientes</i> | <i>seguimiento de los pacientes</i> | <i>resultado evaluado</i> | <i>variable que marca el pronóstico</i> | <i>análisis de los datos</i> | <i>tratamiento subsiguiente a la inclusión en la cohorte</i> | <b>COMENTARIOS</b>   |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|--|
| Mecher (20)    | ?                           |                                     |                           |   | ?                            |  | El muestreo fue por conveniencia, poco tiempo de seguimiento, no tuvo ajuste estadístico para otros factores pronósticos importantes |
| Bakker (21)    | ?                           |                                     |                           |   |                              |  | El muestreo fue por conveniencia, poco tiempo de seguimiento   |
| Valle (22)     |                             |                                     |                           |   | ?                            |  | El muestreo fue por conveniencia, no tuvo ajuste estadístico para otros factores pronósticos importantes                             |
| Troskot (23)   |                             |                                     |                           |   |                              |  | El muestreo fue por conveniencia   |
| Van Beest (24) |                             |                                     |                           |   |                              |  | El muestreo fue por conveniencia   |
| Ospina (25)    |                             |                                     |                           |   | ?                            |  | El muestreo fue por conveniencia, no tuvo ajuste estadístico para otros factores pronósticos importantes                             |
| Du (26)        |                             |                                     |                           |   | ?                            |  | El muestreo fue por conveniencia, no tuvo ajuste estadístico para otros factores pronósticos importantes                             |
| Zhao (27)      |                             |                                     |                           |   | ?                            |  | El muestreo fue por conveniencia, no tuvo ajuste estadístico para otros factores pronósticos importantes                             |
| Zhang (28)     | ?                           |                                     |                           |   | ?                            |  | El muestreo fue por conveniencia, poco tiempo de seguimiento, no tuvo ajuste estadístico para otros factores pronósticos importantes |
| Mallat (29)    | ?                           |                                     |                           |   | ?                            |  | El muestreo fue por conveniencia, poco tiempo de seguimiento, no tuvo ajuste estadístico para otros factores pronósticos importantes |
| Mallat (30)    |                             |                                     |                           |   | ?                            |  | El muestreo fue por conveniencia, no tuvo ajuste estadístico para otros factores pronósticos importantes                             |
| Ospina (31)    |                             |                                     |                           |   |                              |  | El muestreo fue por conveniencia   |



Riesgo no claro



Bajo riesgo de sesgos



Alto riesgo de sesgo