

TABLA 1. Criterios de inclusión y de exclusión específicos según la patología en Aorta Torácica Descendente (ATD).

<b>CRITERIOS DE INCLUSION</b>
<i>Aneurisma de Aorta Torácica Roto (AATR)</i> Fístula aortobronquial Fistula aortoesofágica
<i>Transección Traumática de aorta torácica (TAT)</i> Transección completa o incompleta de ATD secundaria a un evento traumático.
<i>Disección aguda de aorta torácica complicada (DATBc)</i> Pacientes diagnosticados dentro de los 14 días desde el inicio de la clínica y aparición de alguna de las siguientes complicaciones: <ul style="list-style-type: none"><li>- síndrome de mala perfusión o isquemia visceral</li><li>- hipertensión refractaria al tratamiento</li><li>- ruptura</li><li>- dolor incontrolable</li></ul> (la disección debe ser distal a la salida de la arteria subclavia izquierda)
<b>CRITERIOS DE EXCLUSION</b>
Aneurismas micóticos
Disecciones retrógradas del cayado desde el punto de entrada
Tortuosidad severa del acceso iliaco

Tabla 2. Variables de estudio preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias.

<b>Variables preoperatorias o demográficas</b>		
Edad		
Sexo		
Factores de Riesgo Cardiovasculares	Diabetes Cardiopatía isquémica EPOC Enfermedad Cerebrovascular	
Grado ASA		
Niveles de Creatinina		
<b>Variables específicas por indicación</b>		
	Aguda /Crónica	
	Complicaciones agudas	Isquemia visceral Ruptura Dilatación Dolor refractario Isquemia de MMII
Disección de Aorta torácica tipo B (DATB)		
Aneurisma de Aorta torácica (AAT)	Integro /Rotura Etiopatogenia Máximo diámetro de aorta	
Rotura Traumática de aorta torácica (RTAT)	Grado de rotura	
Otros: Hematoma intramural (HIM), ulcera penetrante de aorta (UPA),...		
<b>Variables intraoperatorias</b>		
Zona de Anclaje proximal	Figura 1	
Zona de Anclaje distal	Figura 2	
Número de endoprótesis implantadas		
Tipo de endoprótesis		
Ramas de Cayado de aorta cubiertas	Carótidas, subclavia izquierda, tronco celiaco, arteria mesentérica superior, renales	

Ramas de Cayado de aorta revascularizadas	Carótidas, subclavía izquierda, tronco celiaco, arteria mesentérica superior, renales
Volumen de pérdida de sangre	
<b>Variables postoperatorias</b>	
Hemorragia que requiera reintervención	
Infeción	Respiratoria, protésica, de tejidos, otras.
Isquemia cerebral en los 30 primeros días	incapacitante, no incapacitante.
Paraplejia	
Eventos coronarios agudos	
Terapia renal sustitutiva	
Isquemia mesentérica	
Fallo respiratorio agudo	
<b>Mortalidad a los 30 días</b>	
<b>Supervivencia tras la operación</b>	
<b>Reintervención en los 30 primeros días</b>	