

TABLA 1. Criterios de inclusión y de exclusión específicos según la patología en Aorta Torácica Descendente (ATD).

CRITERIOS DE INCLUSION
<i>Aneurisma de Aorta Torácica Roto (AATR)</i>
Fístula aortobronquial
Fistula aortoesofágica
<i>Transección Traumática de aorta torácica (TAT)</i>
Transección completa o incompleta de ATD secundaria a un evento traumático.
<i>Disección aguda de aorta torácica complicada (DATBc)</i>
Pacientes diagnosticados dentro de los 14 días desde el inicio de la clínica y aparición de alguna de las siguientes complicaciones:
<ul style="list-style-type: none">- síndrome de mala perfusión o isquemia visceral- hipertensión refractaria al tratamiento- ruptura- dolor incontrolable
(la disección debe ser distal a la salida de la arteria subclavia izquierda)
CRITERIOS DE EXCLUSION
Aneurismas micóticos
Disecciones retrógradas del cayado desde el punto de entrada
Tortuosidad severa del acceso ilíaco

Tabla 2. Variables de estudio preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias.

Variables preoperatorias o demográficas				
Edad				
Sexo				
Factores de Riesgo Cardiovasculares	Diabetes Cardiopatía isquémica EPOC Enfermedad Cerebrovascular			
Grado ASA				
Niveles de Creatinina				
Variables específicas por indicación				
Disección de Aorta torácica tipo B (DATB)	Aguda /Crónica			
	Complicaciones agudas	Isquemia visceral		
		Ruptura		
		Dilatación		
		Dolor refractario		
	Isquemia de MMII			
Aneurisma de Aorta torácica (AAT)	Integro /Rotura			
	Etiopatogenia			
	Máximo diámetro de aorta			
Rotura Traumática de aorta torácica (RTAT)	Grado de rotura			
Otros: Hematoma intramural (HIM), ulceración penetrante de aorta (UPA),...				
Variables intraoperatorias				
Zona de Anclaje proximal	Figura 1			
Zona de Anclaje distal	Figura 2			
Número de endoprótesis implantadas				
Tipo de endoprótesis				
Ramas de Cayado de aorta cubiertas	Carótidas, subclavia izquierda, tronco celiaco, arteria mesentérica superior, renales			

Ramas de Cayado de aorta revascularizadas	Carótidas, subclavia izquierda, tronco celiaco, arteria mesentérica superior, renales
Volumen de pérdida de sangre	
Variables postoperatorias	
Hemorragia que requiera reintervención	
Infeción	Respiratoria, protésica, de tejidos, otras.
Isquemia cerebral en los 30 primeros días	incapacitante, no incapacitante.
Paraplejia	
Eventos coronarios agudos	
Terapia renal sustitutoria	
Isquemia mesentérica	
Fallo respiratorio agudo	
Mortalidad a los 30 días	
Supervivencia tras la operación	
Reintervención en los 30 primeros días	