

Tabla 1 Supl.: Variables de laboratorio según los estadios de la clasificación de obesidad por EOSS.

Variable	EOSS 0	EOSS 1	EOSS 2	EOSS 3	EOSS 4	p
N	13	39	165	41	7	
Glucosa (mg/dl)	98 (10)	94 (12)	107 (37)	112 (57)	113 (42)	0,0003
Crcl (ml/min)	96,7 (26,6)	85,39 (45,1)	72,45 (36,1)	77,95 (48,8)	76,36 (27,4)	0,02
Ácido Úrico (mg/dl)	4,8 (2,2)	5,2 (2,6)	6,1 (2)	6,1 (2,1)	5,8 (1,7)	0,02
hsPCR (mg/dl) (230)	1 (2,3)	1,35 (2,6)	1,3 (2,5)	1,65 (3,5)	8,1 (14)	0,32
Colesterol total (mg/dl)	176 (20)	187 (59)	177 (48,6)	156 (42)	169 (36)	0,0008
Triglicéridos (mg/dl)	121 (40)	130 (106)	134 (85)	141 (84)	126 (49)	0,6
GPT (UI/L)	25 (6)	33 (29)	25 (18)	29 (14)	20 (10)	0,03
GGT (UI/L)	34 (14)	27 (37)	35 (36)	55 (68)	33 (29)	0,26
HbA1c (%) (231)	5,4 (0,4)	5,3 (0,4)	6,2 (1,4)	6,4 (1,8)	6,45 (0,7)	0,0000
Hemoglobina (g/dl)	14,3 (1,7)	14 (1,7)	13,8 (2,2)	13,5 (2,4)	13,5 (1)	0,4
Leucocitos (mm ³ /L)	6,17 (1,5)	6,36 (2,07)	7,0 (2,5)	8,5 (2,6)	8,03 (4,7)	0,0000
Ratio Albúmina/creatinina	3,75 (18,2)	4 (25,2)	16 (56,1)	33 (94,8)	6,39 (15,5)	0,006

Las variables cuantitativas se expresan como mediana (Rango intercuartílico); las variables cualitativas se expresan como número absoluto (porcentaje). Crcl: aclaramiento de creatinina. EOSS: sistema de estadificación de la obesidad de Edmonton; GGT: gamma glutamil transpeptidasa. GPT: glutamato piruvato transaminasa. HbA1c: hemoglobina glicosilada. hsPCR: proteína C reactiva de alta sensibilidad.

Tabla 2 Supl.: Características del tratamiento médico según los estadios de la clasificación de obesidad por EOSS

Variable	EOSS 0	EOSS 1	EOSS 2	EOSS 3	EOSS 4	p
N	13	39	165	41	7	
Metformina	0 (0,0)	0 (0,0)	65 (39,4)	19 (46,3)	5 (71,4)	0,001
Sulfonilureas	0 (0,0)	0 (0,0)	9 (5,4)	2 (4,8)	1 (14,3)	0,36
IDPP4	0 (0,0)	0 (0,0)	27 (16,4)	6 (14,6)	3 (42,9)	0,006
arGLP1	0 (0,0)	0 (0,0)	20 (12,1)	9 (21,9)	1 (14,3)	0,02
iSGLT2	0 (0,0)	0 (0,0)	7 (4,2)	6 (14,6)	1 (14,3)	0,02
Insulina	0 (0,0)	0 (0,0)	31 (18,8)	12 (29,2)	3 (42,9)	0,003
Estatinas	0 (0,0)	13 (33,3)	104 (63)	33 (80,5)	2 (28,6)	0,001
Ezetimibe	0 (0,0)	2 (5,1)	19 (11,5)	5 (12,2)	2 (28,6)	0,24
IECAs	0 (0,0)	0 (0,0)	48 (20,1)	18 (43,9)	1 (14,3)	0,001
ARAI	0 (0,0)	0 (0,0)	76 (46,1)	17 (41,5)	1 (14,3)	0,001
Diuréticos	0 (0,0)	3 (7,7)	90 (54,5)	25 (60,1)	5 (71,4)	0,001
Betabloqueantes	0 (0,0)	3 (7,7)	43 (26,1)	22 (53,7)	2 (28,6)	0,001
Calcioantagonistas	0 (0,0)	0 (0,0)	58 (35,1)	17 (41,4)	1 (14,3)	0,001
IBP	4 (30,8)	10 (25,6)	94 (56,1)	29 (70,8)	6 (85,7)	0,0001
AINEs	3 (23,1)	3 (7,7)	31 (18,8)	9 (21,9)	0 (0,0)	0,27
Antidepresivos	3 (23,1)	5 (12,8)	36 (21,8)	14 (34,1)	3 (42,6)	0,14
Ansiolíticos	3 (23,1)	8 (20,5)	39 (23,6)	13 (31,7)	4 (57,1)	0,24

Las variables cuantitativas se expresan como mediana (rango intercuartílico); las variables cualitativas se expresan como número absoluto (porcentaje). AINEs: antiinflamatorios no esteroideos; ARAII: antagonistas del receptor de la Angiotensina 2; arGLP1: análogos del GLP1; EOSS: sistema de estadificación de la obesidad de Edmonton; IBP: inhibidores de la bomba de protones. IDPP4: inhibidores dipeptidil peptidasa-4. IECAs: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2.