Study or Subgroup	Cryobiopsy Events	Cryobiopsy Total	Standard forceps biopsy Events	Standard forceps biopsy Total	Weight	Risk Difference M-H, Random, 95% CI	Year
Schuhmann 2013	23	31	19	31	10.3%	0.13 [-0.10, 0.36]	2013
Herath 2017	4	6	2	5	3.0%	0.27 [-0.30, 0.84]	2017
Hibare 2017	19	28	21	28	10.1%	-0.07 [-0.31, 0.16]	2017
Arimura 2018	20	23	19	23	11.3%	0.04 [-0.16, 0.25]	2018
Taton 2018	20	29	11	29	9.7%	0.31 [0.07, 0.55]	2018
Imabayashi 2019	33	36	24	29	13.5%	0.09 [-0.08, 0.25]	2019
Kho 2019	30	38	47	76	13.2%	0.17 [0.00, 0.34]	2019
Nasu 2019	43	53	46	53	14.8%	-0.06 [-0.20, 0.08]	2019
Udagawa 2020	38	57	49	57	14.1%	-0.19 [-0.34, -0.04]	2020
Total (95% CI)		**301**		**331**	**100.0%**	**0.05 [-0.06, 0.15]**	
Total events	230		238				

Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 20.15, df = 8 (P = 0.010); I² = 60%

Test for overall effect: Z = 0.88 (P = 0.38)



Downloaded from http://www.elsevier.es, qsh 53\08\2022. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.