


Manejo de Insuficiencia Cardíaca Actuación Dirigida a Optimizar MICADO

Encuesta sobre la implementación de las guías de IC en la práctica clínica real e impacto de las nuevas recomendaciones



RESULTADOS

Sexo
387 respuestas




● Mujer N=173
● Varón N=214

Edad
Media $39,5 \pm 10,3$ años
Mediana 38 (31-46)

Años de ejercicio profesional
Media $13,4 \pm 9,7$
Mediana 11 (5-20)

RESULTADOS

Hospital
387 respuestas




● La Paz
● Ramón y Cajal
● Puerta de Hierro
● Jiménez Díaz
● Gregorio Marañón
● Infanta Leonor
● La Princesa
● 12 de Octubre

▲ 1/13 ▼

RESULTADOS

Posición actual
387 respuestas




● Cardiólogo con especial dedicación a la IC
● Cardiólogo no dedicado a la IC
● Residente de Cardiología
● Médico Internista con especial dedicación a la IC
● Médico Internista sin especial dedicación a la IC
● Residente de Medicina Interna
● Otra especialidad
● Otros residente

Grado de aceptación de las guías de práctica clínica de IC de 2021

5


RESULTADOS



6

RESULTADOS


En líneas generales, ¿le han gustado las nuevas guías de IC de 2021?
386 respuestas



7

RESULTADOS

Del 1 al 10, ¿cuánto le han gustado las nuevas guías de IC de 2021? Media $7,4 \pm 1,3$
385 respuestas Mediana 8 (7-8)



8



9



10



11




12




13



14



15




16

RESULTADOS

Independientemente de la existencia o no de un protocolo en su centro y según su experiencia, ¿en cuánto tiempo cree que puede INICIAR los 4 grupos farmacológicos para la ICFeR en un paciente ambulatorio de novo?


386 respuestas



RESULTADOS

¿Y en cuánto tiempo cree que puede INICIAR los 4 grupos farmacológicos para la ICFeR en un paciente ambulatorio crónico?

385 respuestas




17

18

RESULTADOS

Según su experiencia, ¿cuál cree que será la principal dificultad para implementar la cuádruple terapia en los pacientes con ICFeR?


384 respuestas



RESULTADOS


En un paciente ambulatorio que debuta con ICFeR, ¿cuál sería su elección de tratamiento INICIAL?

386 respuestas




19


20




21



22




23



24

RESULTADOS

Durante el inicio de los cuatro grupos de fármacos, ¿qué prioriza?
386 respuestas



Experiencia con los iSGLT2

RESULTADOS


¿Cuándo comenzó a prescribir iSGLT2 a los pacientes con IC?
379 respuestas




RESULTADOS

Cuando inicia un iSGLT2 en un paciente con ICfEr, ¿modifica la pauta diurética?
380 respuestas





29



30



31




32

RESULTADOS

A la hora de valorar un dispositivo de terapia resincronización cardíaca y/o desfibrilador en un paciente con ICFer, ¿espera a que el paciente esté con la cuádruple terapia?

375 respuestas




33

RESULTADOS

En caso de que tolere los 4 grupos, ¿cuánto tiempo suele esperar para revalorar la necesidad de un dispositivo de terapia resincronización cardíaca y/o desfibrilador en un paciente con ICFer?

371 respuestas




34

RESULTADOS

¿Está empleando iSGLT2 en pacientes no diabéticos con FEVI no reducida?

379 respuestas




35

RESULTADOS

En caso afirmativo, ¿cuál emplea?

265 respuestas




36

RESULTADOS



¿Su hospital cuenta en Farmacia con ISGLT2 para pacientes no diabéticos hospitalizados por IC?
 363 respuestas



RESULTADOS



Si dispusiera de ISGLT2 en su hospital para los pacientes ingresados por IC, ¿en qué momento cree que sería mejor iniciarlo?
 377 respuestas

